

Chemical Composition:

Metalaxyl Technical (Based on 90% W/W a.i.)	38.90 % W/W
Wetting Agent (Stearyl Benzimidazol disulphonic Acid)	3.00 % W/W
Dispersing Agent (Condensate of formaldehyde and naphthalene phenol sulfonic acid sodium salt)	7.00 % W/W
Sticking Agent (Carboxy Methyl Cellulose)	0.20 % W/W
Kaolin, Silicic acid, Chalk	50.90 % W/W
Total: 100.00 % W/W	

रासायनिक संरचना :

मेटालेक्सिल टेक्निकल (९० प्रतिशत शुद्धता पर आधारित)	३८.९० % भार/भार
वेटिंग एजेंट (स्टीरॉइल बेन्जीमिडाजोल डाइसल्फोनिक अॅसिड)	३.०० % भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट (कंडेन्सेट ऑफ फारमलडीहाईड एवं नैफथोलिन फिनोल सल्फोनिक अॅसिड सोडियम साल्ट)	७.०० % भार/भार
स्टीकिंग एजेंट (कार्बोक्सी मिथाईल सैल्यूलोस)	०.२० % भार/भार
काओलीन, सिलिसिक अॅसिड, चॉक	५०.९० % भार/भार
योग : १००.०० % भार/भार	

Recommendations : For the control of downy mildew in maize, bajra, sorghum and sunflower and white rust in mustard as wet seed dresser.

Direction of use : Please read enclosed leaflet before use.

Precautions : 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation at the time of application. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after application. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while application. 6) Wear full protective clothing while mixing and application.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

First aid : Please see enclosed leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed leaflet.

उपयोग : इसका प्रयोग आर्द्र बीजोपचार के रूप में मक्का, बाजरा, ज्वार एवं सुर्यमुखी की मृदुरेमिल फफूंदी तथा सरसों के सफेद गेरुई के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लिफलेट पढ़ें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) त्वचा, मुँह और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव के बाध्य को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं है। लक्षण अनुसार इलाज करें।

प्राथमिक चिकित्सा : कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें। **लक्षण :** कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें।

Please read enclosed leaflet carefully before use. Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रयत्न ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।



Mfg. & Mkted. by:
ELANTA AGRO PVT. LTD.
Address : G-6/7, Krishna Sagar, Chaman Hsg. Soc. Near Railway Gate,
Sector-10, Okhla, New Delhi-110025, India.
e-mail : elantagroup@gmail.com Cust. Care no. (GM) + 91 233 2940403
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no. 9, KUPVAD - 416 406,
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Regn. No. / व.स. नं.: CIR-174882/2020-Metalaxyl (WS) (423) - 682
Mfg. Lic. No. / मंजु. ला. नं.: LCM032020025

Batch No. / बैच नं.

Mfg. Date / मंजु. तिथि

Exp. Date / ख़त होने की तिथि

Net Content Volume / शुद्ध भार/आयतन

Max. Retail Price / अधिकतम ख़ुरा मूल्य ₹. (incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Metalaxyl 35% W.S. (Systemic Fungicide)
मेटालेक्सिल ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक (अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

ELAXYL® 35

CIR-174882/2020-Metalaxyl (WS) (423) - 682

Metalaxyl 35% W.S.
Systemic Fungicide

मेटालेक्सिल ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक
अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक

ELAXYL® 35

इलॉकझील ३५

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.

Keep out of
reach of
children



सूखी और ठण्ठी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें

Net
Content
500 g

elANTA® An ISO 9001:2015
certified company **एलंटा®**

Metalaxyl 35% W.S. (Systemic Fungicide)
मेटालेक्सिल ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक (अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

ELAXYL® 35



An ISO 9001:2015 certified company

Elaxyl - 35

Metalaxyl W.S.

(Systemic Fungicide)

इलॅक्झील-३५

मेटालेक्सील ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक
(अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

CIR-174882/2020-Metalaxyl (WS) (423)-682

Elaxyl - 35

Metalaxyl 35% W.S.

(Systemic Fungicide)

Metalaxyl 35% WS is a highly active and systemic fungicide based on the active ingredient, metalaxyl. It contains 350 gm active ingredient per kg of the product. It is used as a wet slurry seed dresser.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (gm)			
Sorghum	Downy mildew	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4 months depending on the variety	
Bajra	Downy mildew	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3 - 3.5 months depending on the variety	
Maize	Sorghum downy mildew,	Slurry seed treatment with 240 g/100 Kg seed	700 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4months depending on the variety	
Sugarcane	downy mildew, Phillippine downy mildew, Brown stripe downy mildew	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4 months depending on the variety	
Mustard	White rust	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4 months depending on the variety	
Sunflower	Downy mildew	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4 months depending on the variety	

Direction of use : For small lots, mix the required quantity of Metalaxyl 35% WS with 10-20 ml of water for each kg of seed to be treated. Add the slurry to the seed and rotate or stir the container (plastic drum or plastic bag) until the seeds are uniformly covered. Usually less than a minute, Metalaxyl 35 WS is recommended for application as slurry with continuously operating commercial seed dressing equipment for preparation of slurry proceed as follows : 1) Fill the slurry tank with the required volume of water which will be 1.5 times the quantity of Metalaxyl 35 WS to be used. As a general rule, this will be about 750 ml and should not exceed 1000 ml /100 kg seed even when other products are used in combination treatments. 2) Add the specified quantity of Metalaxyl 35 WS on the water surface. 3) Wait until the product has completely disappeared into the water without stirring. 4) Stir the solution for about 10 minutes. The Slurry is ready for immediate application. Use the slurry to treat seeds as required in a seed treating drum. Dry the seeds in shade before sowing. No significant deleterious effects are noticed on seed viability and disease control in Metalaxyl 35 WS treated seeds for a period of 12 months, provided seeds are of high quality to begin with and are stored under prescribed cool, dry conditions.

Precaution : 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation at the time of application. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after application. Do not smoke, drink, eat and chew anything while application. 5) Wear full protective clothing while mixing and application. **Symptoms of poisoning :** Lethargy, difficulty in breathing, irritation in eye, spasticity in muscles, abnormal posture may occur. **First aid :** 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air. **Phytotoxicity :** The product is not phytotoxic when used as per field recommendation. **Antidote :** No specific antidote is known, treat symptomatically. **Disposal of used container :** 1) Packages or surplus materials and washing from the machine and container should be disposed off in safe manner as to prevent environment and water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages shall be broken and buried away from habitation. **Storage conditions :** 1) The packages containing fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other article of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2) The rooms of premises meant for storing the fungicides shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination.

Chemical composition :

Metalaxyl Technical (Based on 90% w/w a.i.)	38.90 % W/W
Wetting Agent Stearyl Benzimidazol disulphonic Acid	3.00 % W/W
Dispersing Agent Condensate of Formaldehyde and Naphthalene phenol sulfonic acid sodium salt	7.00 % W/W
Sticking Agent Carboxy Methyl Cellulose	0.20 % W/W
Kaolin, Silicic acid, Chalk	50.90 % W/W

Total : 100.00% W/W

Manufactured by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-174882/2020-Metalaxyl (WS) (423)-682

इलॅक्झील - ३५

मेटालेक्सील ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक
(अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

मेटालेक्सील ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक है। एक किलो मेटालेक्सील ३५ प्रति आर्द्र बीजोपचारक में ३५० ग्राम क्रियाशील तत्व होता है। इसका उपयोग गीले बीजोपचार के लिए होता है।

उपयोग :

फसल	बीज के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि)	अनिम्न छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पूर. प्रवेश की अवधि अवधि के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)			
ज्वार	मूदरोमिल फफूंदी	बीज उपचार २०० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	६०० ग्रा./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि.	३.५ से ४ महिने	
बाजरा	मूदरोमिल फफूंदी	बीज उपचार २०० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	६०० ग्रा./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि.	३.५ से ४ महिने	
मक्का	ज्वार मूदरोमिल फफूंदी, गन्ना मूदरोमिल फफूंदी, फिलियाइन मूदरोमिल फफूंदी, भूराभान मूदरोमिल फफूंदी	बीज उपचार २४० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	७०० ग्रा./ १०० किलो	१.० लि.	३.५ से ४ महिने	
सरसों	सफेद गेरूँ	बीज उपचार २४० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	६०० ग्रा./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि.	३.५ से ४ महिने	
सूर्यमुखी	मूदरोमिल फफूंदी	बीज उपचार २४० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	६०० ग्रा./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि.	३.५ से ४ महिने	

उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग विधि और कृषि रक्षा यंत्र उपयोग के लिए - बीज की कम मात्रा होने पर प्रति किलो बीज के उपचार के लिए एस फफूंदीनाशक की जरूरत मात्रा १० से २० मी.ली. पानी में मिलाएँ। इस घोल को बीज में मिलाएँ और काढ़ी को अच्छी तरह हिलाएँ जब तक कि बीज के उपर फफूंदीनाशक अच्छी तरह से न लगा जाए। (लगभग एक मिनट से कम) बीज की बड़ी मात्रा होने पर इस फफूंदीनाशक से बीज उपचार करने के लिये उपचार यंत्र की सिफारिश की जाती है। घोल बनाने की विधि इस प्रकार है - १) काढ़ी को आवश्यक पानी की मात्रा आयतन के अनुसार भरें, जिसकी मात्रा मेटालेक्सील ३५ आर्द्र बीजोपचार की मात्रा से १.५ गुना ज्यादा होगी। सामान्यतः नियमानुसार यह लगभग ७५० मी.ली. और १००० मी.ली. / १०० किलो बीज से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले ही उपचार के लिए इसमें अन्य उत्पादन मिलें हो। २) पानी की सतह पर मेटालेक्सील ३५ आर्द्र बीजोपचारक की निश्चित मात्रा मिलाएँ। ३) तब तक रुकिए जब तक की उत्पाद बिना हिलाएँ अपने आप पानी में घुलने लगे। ४) घोल को लगभग १० मिनट तक हिलाएँ। अब घोल तुरन्त उपयोग के लिए तैयार है। घोल को अब बीज उपचार के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बीजों को बोने से पहले छाया में सुखा लें। मेटालेक्सील ३५ आर्द्र बीजोपचारक से उपचारित बीजों की क्षमता में १२ महिनों तक कोई हानिकारक असर नहीं होता है, यदि बीज अच्छी किस्म के हैं और उन्हें निर्धारित तरीके से शीतल शुष्क वातावरण में रखा गया हो। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) त्वचा, मुँह और आँखों के सम्पर्क से बचें। ३) प्रयोग करते समय सांसद्वारा अन्दर जाने से बचें। ४) प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह साबुन से धोएँ। ५) प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र, दस्ताने, जूते चश्मा पहनना चाहिए। **विष के लक्षण :** ज्यादा सुस्ती आना, सांस लेने में तकलीफ, आँखें में जलन, मांसपेशियों में अकड़न, असामान्य अवस्था हो सकती है। **प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निजाले जाने तो लले के पीछे मुगनुद्री करके उल्टी कराएँ यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को कार्बोनी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। ३) यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको कार्बोनी मात्रा में सैलाईन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएँ। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो योगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **पौधेशक्तिता :** सुखाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधेशक्ति नहीं है। **विषनाशक :** कोई विशेष विषनाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १) फफूंदीनाशक निर्माताओं या कर्ता का कर्तव्य है खाली डिब्बों, को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) प्रयोग किए हुए डिब्बों को प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ३) खाली डिब्बों या बची सामग्री का धवन का निपटारा इस प्रकार करें की आसपास कि चीजें, पानी प्रदूषित न हो। **संग्रहण की शर्तें :** १) कीटनाशक से भरे डिब्बों को अलग कमरे या जगह में रखें तथा उन कमरे या जगह से दूर रखें, जिन में अन्य वस्तुएँ रखी जाती है या अलग अलमारियों में ताला चाबी लगाकर कीटनाशक की मात्रा व गुण के हिसाब से रखें। २) जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करण हो वह अच्छी तरह सूखा, निर्मित, पर्याप्त रोशनी ही हवादार तथा पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि कोई प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना :

मेटालेक्सील टैक्निकल (९० प्रतिशत शुद्धता पर आधारित)	३८.९ % भार/भार
वेटिंग एजेंट (स्टीरिली बेंजीमीडाजोल डाइसल्फोनिक एसिड)	३.०० % भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट (कंडेन्सेट आफ फारमलडीहाईड एवं नैफथैलिन)	७.०० % भार/भार
फिनिश सल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट)	
स्टीकिंग एजेंट (कारबोक्सी मिथाईल सैल्यूलोज)	०.२० % भार/भार
काओलीन, सिलिसिक एसिड, चार्क	५०.९० % भार/भार

योग : १००.००० % भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं. - ९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सव्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।



इलॅक्झील - ३५
मैटालेक्सिल ३५% डब्ल्यू. एस.
(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

मैटालेक्सिल ३५% बीयागांवरील आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे, एक किलो मैटालेक्सिल ३५% मध्ये ३५० क्रियाशील तत्त्व आहेत याचा उपयोग ओल्या बीयागांवर केला जातो.

शिफारस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)	पुनः फवारणी करावची शक्यता (दिवसांत)
		स. तत्त्व (ग्रॅम)	संरचना (ग्रॅम)			
ज्वारी	केवडा (डाउनी मिल्ड्यू)	बीजोपचार २०० ग्रॅ. प्रति १०० किलो बीयागे	६०० ग्रॅ./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि./१००	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	
बाजरी	केवडा (डाउनी मिल्ड्यू)	बीजोपचार २०० ग्रॅ. प्रति १०० किलो बीयागे	६०० ग्रॅ./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि./१००	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	
मका	ज्वारीवरील केवडा, उसावरील केवडा, फिलीपाईन केवडा, तपकिरी पट्टाचा केवडा	बीजोपचार २४० ग्रॅ. प्रति १०० किलो बीयागे	७०० ग्रॅ./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि./१००	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	
मोहरी	पांढरा तांबेरा	बीजोपचार २०० ग्रॅ. प्रति १०० किलो बीयागे	६०० ग्रॅ./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि./१००	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	
सूर्यफूल	केवडा (डाउनी मिल्ड्यू)	बीजोपचार २०० ग्रॅ. प्रति १०० किलो बीयागे	६०० ग्रॅ./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि./१००	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	

वापरचे निर्देशन : प्रत्येक एक किलो बीयागासाठी आवश्यक प्रमाणात मैटालेक्सिल ३५% डब्ल्यू. एस. १०-१२ मिली पाण्यात मिसळा. बीयागे फॉस्फोरस ड्युम किंवा मिश्री मध्ये घालून जोपर्यंत एकसारखे होत नाही तोपर्यंत ढवळा, (कमीतकमी एक मिनिट) द्रावणाचे मिश्रण बनविण्याची पध्दत - १) ड्रममध्ये आवश्यक तेवढे पाणी घ्या. पाण्याचे प्रमाण मैटालेक्सिल ३५% डब्ल्यू. एस. चे प्रमाणाच्या वीडपट जास्त असावे. उपचाराचे इतर कोणतेही उत्पादन असले तरीही सामान्यतः ७५० मि.ली. आणि १००० मि.ली. / १०० किलो पेक्षा अधिक बीयागे असू नयेत. २) पाण्यामध्ये मैटालेक्सिल ३५% निश्चित प्रमाणात मिसळा. ३) द्रावणाचे मिश्रण न ढवळाही उत्पादन पूर्णपणे मिसळवण्यात थांबावे. ४) द्रावणाचे मिश्रण १० मिनिटे हलवा. आत मिश्रण उपयोगासाठी तयार आहे.

वापर करताना घ्यावयाची दक्षता : १) फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नये. २) तोंड, त्वचा आणि डोक्यांचा संपर्क टाळावा. ३) द्रावणाचे मिश्रण वापरत असताना तुषार श्वसनाद्वारे आत घेऊ नका. ४) फवारणीनंतर दूषित कपडे व शरीराचे भाग भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) द्रावणाचे मिश्रण वापरत असताना धुप्रपान, छागे, पिणे अथवा चवळू नये. ६) द्रावणाचे मिश्रण वापरत असताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे, हातमोजे, मुखवटा, चष्मा व बुट वापरावेत.

विषबाधेची लक्षणे : सुस्ती येणे, श्वसनास त्रास, डोक्यांची जळजळ, चनायु आखडेणे, असामान्य अवस्था

प्रथमोपचार : १) जर बाधीत व्यक्तीने मिळले असले तर, रसात बोट घालून उलटी करावी हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. २) कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोक्यांचा संपर्क टाळून आल्यास लगेच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिटे हळके मारावेत. ४) जर श्वसनाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणायला.

पौधविषाक्तता : शिफारसीनुसार वापरल्यास मिश्रण वनस्पतीकरीता विषारी नाही.

विषनाशक : कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लष्मणानुसार उपचार करा.

रिक्तान्या डब्यांची विल्हेवाट : १) रिक्तान्या डब्यांचा पुर्नवापर टाळण्यासाठी ते फोडावेत आणि वस्तीपासून दूर मातीमध्ये पुरावेत. २) रिक्तान्या डबे पुर्नवापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिक्तान्या डबे, राहिलेले साहित्य तसेच यंत्र धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी जेणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये.

सादवगण्या अटी : १) कितकनाशक साठविण्यात येणार आहे तेथे अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागोपासून दूर जागी व कडीकुलप असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) ज्या खोलीमध्ये किंवा कपाटामध्ये हे कितकनाशक साठविण्यात येणार आहे ती जागा उत्तम बांधणीची कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडत व पुरेशी मोठी असावी जेणेकरून कोणतेही प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना :

मैटालेक्सिल टॅब्लेट (१०% व/व वर आधारित)	३८.९% व/व
वॉर्टिंग एजेंट (स्टीरॉइल बेंजीमीझोले डाइसल्फोनीक ॲसिड)	३.००% व/व
डिस्पर्सिंग एजेंट (कॅसेट ऑफ फारमलडीहाइड आणि नैफथोलिन)	७.००% व/व
फिनोले सल्फोनीक ॲसिड सोडियम सॉल्ट	
स्टीरॉइल एजेंट (कारबॉक्सी मिथाईल सॅल्यूलोस)	०.२०% व/व
काओलीन, सिलिसिक ॲसिड, चॉक (कॅल्शियम कार्बोनेट)	५०.९०% व/व

एकूण: १००.०००% व/व

निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,
 जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
 उत्पादन परिसर : सव्हें नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
 या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

ಎಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35
ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS
(ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಎಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35, ಇದು ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಮತ್ತು ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 350 ಗ್ರಾಂ ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಸ.ಘ. ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೆಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆರಬೆ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ		ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಲೀ.ಗಲಲ್ಲಿ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಂತರ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ (ಗ್ರಾಂ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ (ಗ್ರಾಂ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ)		
ಬೇಳೆ	ಬೂಜುರೋಗ	ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆ 200ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	600 ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ	3.5-4 ತಿಂಗಳು ತಳ ಪ್ರಕಾರ
ಸಜ್ಜೆ	ಬೂಜುರೋಗ	ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆ 200ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	600 ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ	3-3.5 ತಿಂಗಳು ತಳ ಪ್ರಕಾರ
ಗೋಡುಬೀಜೋಳ	ಬೀಜೋಳದ ಡೌನಿಮಿಲ್ಡ್, ಕಬ್ಬಿನ ಡೌನಿಮಿಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನಿಮಿಲ್ಡ್, ಡೌನಿ ಸ್ಪೈಡ್‌ಡೌನಿಮಿಲ್ಡ್ ಬೆಳೆತುಕ್ಕುರೋಗ	ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆ 240ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	700ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ	3.5-4 ತಿಂಗಳು ತಳ ಪ್ರಕಾರ
ಸಾಸು	ಬೂಜುರೋಗ	ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆ 200ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	600ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ	3.5-4 ತಿಂಗಳು ತಳ ಪ್ರಕಾರ
ಸೂರ್ಯಕಾಂಠಿ	ಬೂಜುರೋಗ	ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆ 200ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	600ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ	3.5-4 ತಿಂಗಳು ತಳ ಪ್ರಕಾರ

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ : ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜಕ್ಕೆ : ಪ್ರತಿ ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆಗಾಗಿ 10-20 ಮಿಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS ನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಸ್ಪಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸ್ಪಿಕ್ ಡ್ರಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹರಿಸುವಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ. ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS ನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 1) ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತುಂಬಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ 1.5 ಪಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 750 ಮಿ.ಲೀ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದಾಗಲೂ 1000 ಮಿ.ಲೀ/100 ಕೆ.ಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮೀರಬಾರದು. 2) ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. 3) ಅದನ್ನು ಅಲಗುಗಡಿಸಿದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವಂತೆ ಕಾಯಿ. 4) ನಂತರ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವಲ್ಪಿಯನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ನಂತರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬೀಜ ಇದ್ದರೆ, ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್‌ನಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬೀಜಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಡೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯಚಿಹ್ನೆಗಳು : ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ, ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಲು ತುಂಬುವ ಶ್ಯಾನ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೇಡದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಜಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಧರಿಸಿ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಷ ತುಂಬಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಅಲ್ಪ, ಉಸಿರಾಡುವ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣು ಉರಿ, ವಕ್ರಗಂಧ, ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಒಂದು ವೇಳೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೆರಳು ತುಂಬಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗಿಯು ಪ್ರತ್ಯಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಿಸಬೇಡಿ. ದೂಷಿತ ಬೇಡದ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿದ್ದರೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ಯಾನ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತುಡ್ಡವಾದ ಗಾಳಿಗೆ ತನ್ನಿ.

ಸೂಚನೆಗಳು : ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಪಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ : ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾರಿಲುಪಡಿಸುವಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮುಂಬಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಿಡಬೇಕು.

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳು : ಉತ್ಪನ್ನವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲವಾದಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಧರಡನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಜಿಂಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇನ್ನು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ನೀರಿನ ಹಿತವಿರದಂತೆ ಮಲಿನವಾಗಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಠಾಣಾಯಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಟೆಕ್ಸಿಕ್ಟಲ್ (90.00% w/w ಸ.ಘ ಅಧಾರಿತ)	38.90% W/W
ವೆಟ್‌ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ - ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ದೆಂಜಿಮಿಡಾಜೋಲ್	3.00% W/W
ಡೈಸ್‌ಸಲ್ವೆಂಟ್ ಆಸಿಡ್	
ಡಿನ್‌ಸರ್‌ಗಿಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ : ಕೆಂಪೆನಿಸಿಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಪ್ಪೆನ್‌ನ ಟಿಪಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲವಣ	7.00% W/W
ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ : ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್	0.20% W/W
ಕೆಪ್ಸೂಲಿಂಗ್, ಸಿಲಿಕಾ ಆಸಿಡ್, ಬಾಕ್	50.90% W/W

ಒಟ್ಟು : 100.00% W/W

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ. ಲಿ.,
 ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟು ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ್, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.
 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436
 ತಾ: ಮರಬ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043
 ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



ಎಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35

ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS
(ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

इलॅक्झील - ३५

मैटालेक्सिल ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक
(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ. ಲಿ.,
 ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟು ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ್, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.
 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436
 ತಾ: ಮರಬ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.
 ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,
 जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत.
 कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
 उत्पादन परिसर : सव्हें नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

