

Recommendation : It is recommended as plant growth regulator in cotton (American & Desi) and grapes to get maximum yield.

Direction of use : Please read the enclosed leaflet before use.

Precaution : 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Antidote : Inject 1-3 mg. of neostigmine methyl sulphate or choline chloride intravenously. Treat symptomatically.

First aid / Symptoms : Please see enclosed leaflet.

उपयोग : इसका उपयोग कपास (अमरीकी व देशी) तथा अंगूर की फसलों में पौध विकास वर्धक के रूप में अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु किया जाता है।

उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लिफलेट पढ़ें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खादसामग्री, खाद सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष नाशक : १-३ मिग्रा. नियोस्टिगमाइन मिथाइल सल्फेट या कोलीन क्लोराइड अन्तःशिरा द्वारा दें। लक्षणानुसार इलाज करें।

प्राथमिक चिकित्सा / लक्षण : कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें।

Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.



CIR-110862/2013-Chlormequat Chloride (Sol.) (343)-8

CHLORMEQUAT CHLORIDE 50% Sol. Plant Growth Regulator

क्लोर्मेक्वॉट क्लोराइड ५० प्रतिशत एस.एल.


पौध विकास नियन्त्रक

ATTAIN

अटैन

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।



Keep out of
reach of
children

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें



An ISO 9001:2015
certified company



Chemical composition :

Chlormequat chloride Tech. (Based on 97% W/W a.i.)	51.55 % W/W
Distilled Water	48.45 % W/W
Total :	100.00 % W/W

रासायनिक संरचना :

क्लोर्मेक्वॉट क्लोराइड टेक्नीकल (भारतानुसार ९७ % स. त. पर आधारित)	५१.५५ % भार/भार
आसुत जल	४८.४५ % भार/भार
योग :	१००.०० % भार/भार

Regn. No. / रजि.नं. : CIR-110862/2013-Chlormequat Chloride (Sol.) (343)-8

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415,
(M.S.), INDIA. e-mail : elantaagrosangli@gmail.com
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436. Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.



An ISO 9001:2015 certified company

ATTAIN

Chlormequat Chloride 50% Sol.

(Plant Growth Regulator)

अटेन

क्लोस्मेकॉट क्लोराइड ५० प्रतिशत
एस.एल.
(पौध विकास नियन्त्रक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-110862/2013-Chlormequat Chloride (Sol.) (343)-8

ATTAIN

Chlormequat Chloride 50% Sol.

(Plant Growth Regulator)

Chlormequat chloride is a unique growth regulator which shows large range of activity and attribute number of favourable characaters which are desired for maximising the cotton, grapes production in India.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI	Formulation		
Grape	To induce early flowering.	600-1000 ppm	1200-2000	600-1000	(12-20 ml in 10 litres of water.)
Potato	Dipping of cut pieces for 10 minutes.	100 ppm	200 ppm		
Cotton (American)	a) To induce early & uniform flowering. b) To suppress the excessive vegetative growing of plants.	20-40 gm.	40-80	375-600 (for high volume); 125-187 (for low volume)	1.2 ml in 10 litres of water.
Cotton (Desi)	c) To increase the yields. a) To induce early & uniform. b) To suppress the excessive vegetative growth of plants. c) To increase the yields.	75 gm.	150	375-600	
Brinjal	Before sowing seed soaking for 24 hours	50 ppm	100 ppm		

Direction of Use :

Plant Protection Equipment : Use a high volume compression sprayer such as rocker, gator or knapsack sprayers for normal spraying.

Mode of application : Blanket application for cotton, grape, ber, seed soaking for brinjal and dipping of cut pieces for potato.

Time of Application : Cotton (american)- square formation to early flowering

Cotton (desi) - Square formation to early flowering.

Grape - Pre-bloom stage.

Precaution : 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Weakness, headache, tightness of the chest, blurred vision, salivation, sweating, nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal cramps may occur.

First aid : 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : Inject 1-3 mg. of neostigmine methyl sulphate or choline chloride intravenously. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1) Packages shall be broken and buried away from habitation. 2) The used containers or packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3) Packages or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental or water pollution.

Storage conditions : 1) The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises a way from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separated almirahs under lock key depending upon the quantity and nature of materials. 2) The rooms or premises meant storing the materials shall be well built, dry, well-lit ventialed and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapors.

Chemical composition :

Chlormequat chloride Tech.	(Based on 97% W/W a.i.)	51.55 % W/W
Distilled Water		48.45 % W/W

Total : 100.00 % W/W

Manufactured by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-110862/2013-Chlormequat Chloride (Sol.) (343)-8

अटेन

क्लोस्मेकॉट क्लोराइड ५० प्रतिशत एस.एल.

(पौध विकास नियन्त्रक)

क्लोस्मेकॉट क्लोराइड एक अनाच्छा पौध विकास वर्धक है जो कपास की उपज में कई तरीको से प्रभावी असर दिखाता है और पैदावार में बढ़ोतरी करता है। इस पौध विकास सहायक का छिड़काव करने से आम तौर पर पौध घने होते हैं, पत्ते हरे होते हैं। इस प्रकार के पौधों में प्रजनन क्रिया बहुत तेज होती है और समय पर सिंचाई होने पर थोड़े खर्ब में अधिकतम पैदावार होता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स. तत्व	संरचना		
अंगूर	शीघ्र फूल आने में सहायक	६००-१००० पी पी एम	१२००-२००० मिलि.	६००-१०००	१२-२० मि. लि. में १० लि. पानी
आलू	कटे हुए टुकड़ों को १० मिनट भिगोएं	१०० पी पी एम	१०० पी पी एम		
कपास	फूल आने में सहायक, कलियों, फूलों और फलों के झड़ने से रोकने के लिए। फलों के आकार को बढ़ा करने के लिए पैदावार को बढ़ाने और फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए।	२०-४०	४०-८०	३७५-६००	(१.२ मि.लि. में १० लि. पानी)
कपास 'देशी'	फूल आने में सहायक, कलियों, फूलों और फलों के झड़ने से रोकने के लिए। फलों के आकार को बढ़ा करने के लिए पैदावार को बढ़ाने और फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए।	७५	१५० मि.लि.	३७५-६००	(२ मि.लि. में १० लि. पानी)
बैंगन	बोने से पहले, बीज को २४ घंटे भिगोएं	५० पी पी एम	१०० पी पी एम		

उपयोग के लिए निर्देश : छिड़काव यंत्र हाथ से चलाने वाला हार्ड-वाल्यूम कम्प्रेशन स्प्रेयर जैसे रोक़र, गेटर, नैपसेक आदि।
प्रयोग का समय : कपास - 'अमेरिकी' वर्गीकार बनने तथा फूल आना शुरू होने तक। 'कपास 'देशी' वर्गीकार बनने तथा फूल आना शुरू होने तक। 'अंगूर' फुल खिलने से पहले। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष के लक्षण :** कमजोरी, सिरदर्द, छाती में अकड़न, धुंधलापन, लार टपकना, पसीना, भित्तली, उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **विष नाशक :** १-३ मिग्रा.नियोस्टिगमाइन मिथाइल सल्फेट या कोलीन क्लोराइड अन्तःशिरा द्वारा दें। लक्षणानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १) पौधवर्धक नियंत्रक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिये। २) प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोड़ें। ३) डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विरल न हों। **संयुक्त की शर्तें :** १) पौध विकास वर्धक के प्रमाण व प्रकार एवं परिमाणानुसार उन्हें अलग अलग तरीके से ताला चाबी लगाकर रखें। २) जिस कमरे अथवा जगह में पौध विकास वर्धक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बंद हुआ, सूखा प्रकाशयुक्त तथा हवादार एवं आयतन में पर्याप्त लम्बा- चौड़ा होना चाहिये जिससे वातावरण के प्रदूषित होने का डर न रहे।

रासायनिक संरचना :

क्लोस्मेकॉट क्लोराइड टेक्नीकल	(भारानुसार ९७% स.त. पर आधारित)	५१.५५% भार/भार
आसुत जल		४८.४५% भार/भार

योग : १००.००% भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।

