

Chemical Composition:

Metalaxyl Technical (Based on 90% W/W a.i.)	38.90 % W/W
Wetting Agent (Stearyl Benzimidazol disulphonic Acid)	3.00 % W/W
Dispersing Agent (Condensate of formaldehyde and naphthalene phenol sulfonic acid sodium salt)	7.00 % W/W
Sticking Agent (Carboxy Methyl Cellulose)	0.20 % W/W
Kaolin, Silicic acid, Chalk	50.90 % W/W
Total :	100.00 % W/W

रासायनिक संरचना :

मेटालेक्सिल टेक्निकल (९० प्रतिशत शुद्धता पर आधारित)	३८.९० % भार/भार
वेटिंग एजेंट (स्टीरॉल बेंजोइमिडाजोल डाइसल्फोनिक एसिड)	३.०० % भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट (फॉर्मलिन के कंडेन्सेट ऑफ फॉर्मलिन सोल्यूशन)	७.०० % भार/भार
सल्लिंग एजेंट (कार्बोक्सी मीथाइल सेल्यूलोस)	०.२० % भार/भार
काओलीन, सिलिसिक एसिड, चॉक	५०.९० % भार/भार

योग : १००.०० % भार/भार

Recommendations : For the control of downy mildew in maize, bajra, sorghum and sunflower and white rust in mustard as wet seed dresser. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation at the time of application. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after application. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while application. 6) Wear full protective clothing while mixing and application.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

First aid : Please see enclosed leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed leaflet.

उपयोग : इसका प्रयोग आर्द्र बीजोपचार के रूप में मक्का, बाजरा, ज्वार एवं सुर्मुखी की मुतुमिल फंफूदी लहाना सरसों के सफेद गेरुई के निम्नलिखित के लिए किया जाता है। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लिफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और फल/फलियों के चारे से दूर रखें। २) त्वचा, मुँह और अंखियों के सम्पर्क से बचावें। ३) छिड़काव के समय को संस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ घबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं है। लक्षण अनुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें।

Please read enclosed leaflet carefully before use.

Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रयोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों/फसल इस्तेमाल ना करें।



Mkt. & Mfg. By: **ELANTA AGRO PVT. LTD.**

Address : G-47, Krishna Sankul, Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kurla Road, Vilemangal, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA

Phone : 020-26444433, 26444434

Cust. care no. : (Toll free) 1800-123-2644

Manufacturer's Premises : S. No. 19/18, Plot no. 9, KUPWAD - 416 438, Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA

Regn. No. / डि. नं. : CIR-174882/2020-Metalaxyl (WS) (423) - 682

Mfg. Lic. No. / मनु. ला. नं. : LCM0320220025

Batch No. / बैच नं.
Mfg. Date / मनु. तारीख
Exp. Date / कस होने की तारीख
Net Content Volume / शुद्ध मात्रा आयतन
Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹
(incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Metalaxyl 35% W.S. (Systemic Fungicide)
मेटालेक्सिल ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक (अंतर्प्रवाही फंफूदीनाशक)

ELAXYL® 35

CIR-174882/2020-Metalaxyl (WS) (423) - 682

Metalaxyl 35% W.S.
Systemic Fungicide

मेटालेक्सिल ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक
अंतर्प्रवाही फंफूदीनाशक

ELAXYL® 35
इलैक्झील ३५

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
DANGER
खतरा धोका
शुष्क और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें।
बच्चों की पहुँच से दूर रखें

ELANTA® An ISO 9001:2015 certified company **एलंटा®**

Metalaxyl 35% W.S. (Systemic Fungicide)
मेटालेक्सिल ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक (अंतर्प्रवाही फंफूदीनाशक)

ELAXYL® 35



An ISO 9001:2015 certified company

Elaxyl 35

Metalaxyl W.S.

(Systemic Fungicide)

इलॅक्सील ३५

मेटालेक्सील ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-174882/2020-Metalaxyl (WS) (423)-682

Elaxyl 35

Metalaxyl 35% W.S.

(Systemic Fungicide)

Metalaxyl 35% WS is a highly active and systemic fungicide based on the active ingredient, metalaxyl. It contains 350 gm active ingredient per kg of the product. It is used as a wet slurry seed dresser.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (gm)			
Sorghum	Downy mildew	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4 months depending on the variety	
Bajra	Downy mildew	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3 - 3.5 months depending on the variety	
Maize	Sorghum downy mildew,	Slurry seed treatment with 240 g/100 Kg seed	700 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4 months depending on the variety	
Sugarcane	downy mildew, Philippine downy mildew, Brown stripe downy mildew	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4 months depending on the variety	
Mustard	White rust	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4 months depending on the variety	
Sunflower	Downy mildew	Slurry seed treatment with 200 g/100 Kg seed	600 g/100 Kg seed	0.75 - 1.0 Litre / 100 Kg seed	3.5-4 months depending on the variety	

Direction of use : For small lots, mix the required quantity of Metalaxyl 35% WS with 10-20 ml of water for each kg of seed to be treated. Add the slurry to the seed and rotate or stir the container (plastic drum or plastic bag) until the seeds are uniformly covered. Usually less than a minute, Metalaxyl 35 WS is recommended for application as slurry with continuously operating commercial seed dressing equipment for preparation of slurry proceed as follows: 1) Fill the slurry tank with the required volume of water which will be 1.5 times the quantity of Metalaxyl 35 WS to be used. As a general rule, this will be about 750 ml and should not exceed 1000 ml /100 kg seed even when other products are used in combination treatments. 2) Add the specified quantity of Metalaxyl 35 WS on the water surface. 3) Wait until the product has completely disappeared into the water without stirring. 4) Stir the solution for about 10 minutes. The Slurry is ready for immediate application. Use the slurry to treat seeds as required in a seed treating drum. Dry the seeds in shade before sowing. No significant deleterious effects are noticed on seed viability and disease control in Metalaxyl 35 WS treated seeds for a period of 12 months, provided seeds are of high quality to begin with and are stored under prescribed cool, dry conditions. **Precaution :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation at the time of application. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after application. Do not smoke, drink, eat and chew anything while application. 5) Wear full protective clothing while mixing and application. **Symptoms of poisoning :** Lethargy, difficulty in breathing, irritation in eye, spasticity in muscles, abnormal posture may occur. **First aid :** 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air. **Phytotoxicity :** The product is not phytotoxic when used as per field recommendation. **Antidote :** No specific antidote is known, treat symptomatically. **Disposal of used container :** 1) Packages or surplus materials and washing from the machine and container should be disposed off in safe manner as to prevent environment and water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages shall be broken and buried away from habitation. **Storage conditions :** 1) The packages containing fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other article of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2) The rooms of premises meant for storing the fungicides shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination.

Chemical composition :

Metalaxyl Technical (Based on 90% w/w a.i.)	38.90 % W/W
Wetting Agent Stearyl Benzimidazol disulphonic Acid	3.00 % W/W
Dispersing Agent Condensate of Formaldehyde and Naphthalene phenol sulfonic acid sodium salt	7.00 % W/W
Sticking Agent Carboxy Methyl Cellulose	0.20 % W/W
Kaolin, Silicic acid, Chalk	50.90 % W/W

Total : 100.00% W/W

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-174882/2020-Metalaxyl (WS) (423)-682

इलॅक्सील ३५

मेटालेक्सील ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

मेटालेक्सील ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक है। एक किलो मेटालेक्सील ३५ प्रति आर्द्र बीजोपचारक में ३५० ग्रॅम क्रियाशील तत्व होता है। इसका उपयोग गीले बीजोपचार के लिए होता है।

उपयोग :

फसल	बीज के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा बीज अन्तर्गमन (दिनों में)	पूर. प्रवेश को अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)			
ज्वार	मूंदरांमिल फफूंदी	बीज उपचार २०० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	६०० ग्रा./ १०० किलो बीज	०.७५ - १.० लि. / १०० किलो बीज	३.५ से ४ महिने के अनुसार	
बाजरा	मूंदरांमिल फफूंदी	बीज उपचार २०० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	६०० ग्रा./ १०० किलो बीज	०.७५ - १.० लि. / १०० किलो बीज	३.५ से ४ महिने के अनुसार	
मक्का	ज्वार मूंदरांमिल फफूंदी, गन्ना मूंदरांमिल फफूंदी, फिलिपाइन मूंदरांमिल फफूंदी, भूराभ्यान मूंदरांमिल फफूंदी	बीज उपचार २४० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	७०० ग्रा./ १०० किलो बीज	०.७५ - १.० लि. / १०० किलो बीज	३.५ से ४ महिने के अनुसार	
सरसों	सफेद गेरुई	बीज उपचार २४० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	६०० ग्रा./ १०० किलो बीज	०.७५ - १.० लि. / १०० किलो बीज	३.५ से ४ महिने के अनुसार	
सूर्यमुखी	मूंदरांमिल फफूंदी	बीज उपचार २४० ग्रा. प्रति १०० किलो बीज	६०० ग्रा./ १०० किलो बीज	०.७५ - १.० लि. / १०० किलो बीज	३.५ से ४ महिने के अनुसार	

उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग विधि और कृषि रक्षा यंत्र उपयोग के लिए - बीज की कम मात्रा होने पर प्रति किलो बीज के उपचार के लिए एस फफूंदीनाशक की जरूरत मात्रा १० से २० मी. ली. पानी में मिलाए। इस घोल को बीज में मिलाए और काटी को अच्छी तरह हिलाए जब तक कि बीज के उपर फफूंदीनाशक अच्छी तरह से लग जाए। (लमम एक मिन्ट से कम) बीज की बड़ी मात्रा होने पर इस फफूंदीनाशक से बीज उपचार करने के लिये उपचार यंत्र की सफाई की जाती है। घोल बनाने की विधि इस प्रकार है - १) काटी को आवश्यक पानी की मात्रा आमतक के अनुसार भरें, जिसकी मात्रा मेटालेक्सील ३५ आर्द्र बीजोपचार की मात्रा से १.५ गुना ज्यादा होगी। सामान्यतः नियमानुसार लमम ७५० मी. ली. और १००० मी. ली. / १०० किलो बीज से अधिक नहीं होनी चाहिए। भले ही उपचार के लिए इसमें अन्य उत्पादन मिलें हो। २) पानी की सतह पर मेटालेक्सील ३५ आर्द्र बीजोपचारक की निश्चित मात्रा मिलाइए। ३) जब तक रुकिए जब तक की उत्पाद बिना हिलाने अपने आप पानी में पूरी तरह घुल नहीं जाता। ४) घोल को लमम १० मिन्ट तक हिलाइए। अब घोल तुरन्त उपयोग के लिए तैयार है। घोल को अब बीज उपचार के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बीजों को बोने से पहले छाया में सुखा लें। मेटालेक्सील ३५ आर्द्र बीजोपचारक से उपचारित बीजों की क्षमता में १२ महीनों तक कोई हानिकारक असर नहीं होता है, यदि बीज अच्छी किस्म के हैं और उन्हें निधिरित तरीके से शीतल शुष्क वातावरण में रखा गया हो। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) त्वचा, मुँह और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३) प्रयोग करते समय सांसद्वारा अन्दर जाने से बचावें। ४) प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। ५) प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ सनाना नहीं चाहिए। ६) प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र, दस्ताने, जूते बन्धना पहनना चाहिए। **विष के लक्षण :** ज्यादा सुस्ती आना, सांस लेने में तकलीफ, आँखें में जलन, मांसपेशियों में अकड़न, असाध्य अवस्था हो सकती है। **प्राथमिक चिकित्सा:** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करावें। २) यदि कण्डे और त्वचा दूषित हो जाए तो कण्डे उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखें दूषित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में सैलाई/साफ पानी से लमम १०-१५ मिन्ट तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **पौधविनाशकता :** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटकनाशक पौधविनाशक नहीं है। **विषनाशक :** कोई विशेष विषनाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १) फफूंदीनाशक निर्माताओं या कर्ता का कर्तव्य है खाली डिब्बों, को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) प्रयोग किए हुए डिब्बों को प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ३) खाली डिब्बों या बची सामग्री का धोवन का नीपटारा इस प्रकार करें की आसपास कि चीजें, पानी प्रदूषित न हो। **संग्रहण की शर्तें :** १) कीटकनाशक से भरे डिब्बों को अलग कमरों या जगहों में रखें तथा उन कमरों या जगहों से दूर रखें, जिन में अन्य वस्तुएँ रखी जाती है या अलग अलगमरी में ताला चाबी लगाकर कीटकनाशक की मात्रा व गुण के हिसाब से रखें। २) जिस कमरे या अलमारी में कीटकनाशक का भंडारण करण हो वह अच्छी तरह सूखा, निर्मित, पर्याप्त रोशनी व हवादार तथा पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि कोई प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना :

मेटालेक्सील टैक्निकल (९० प्रतिशत शुद्धता पर आधारित)	३८.९ % भार/भार
वेटिंग एजेंट (स्टीरिलीज बीजीमिडाजोल डाइसल्फोनिक एसिड)	३.०० % भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट (कंडेन्सेट आफ फार्मलडीहाइड एवं नैफथलिन)	७.०० % भार/भार
फिनोल सल्फोनिक एसिड सोडियम सल्ट)	
स्टीकिंग एजेंट (कारबोक्सी मिथाईल सैल्यूलोस)	०.२० % भार/भार
काजोलीन, सिलिसिक एसिड, चार्क	५०.९० % भार/भार

योग : १००.००० % भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।

इलॅक्सील ३५ मैटालेक्सिल ३५% डब्ल्यू. एस. (आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

मैटालेक्सिल ३५% बीयाणांवरील आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे, एक किलो मैटालेक्सिल ३५% मध्ये ३५० क्रियाशील तत्व आहेत याचा उपयोग ओल्या बीयाणांवर केला जातो.

शिफारस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)	पुन्हा फवारणीा कालावधी प्रत्येक फवारणी नंतर (तास)
		स. तत्व (ग्रॅम)	संरचना (ग्रॅम)			
ज्वारी	केवडा (डाउनी मिल्ड्यू)	बीजोपचार २०० ग्रॅ. प्रति १०० किलो वियाणे	६०० ग्रॅ./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि./१०० किलो वियाणे	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	
बाजरी	केवडा (डाउनी मिल्ड्यू)	बीजोपचार २०० ग्रॅ. प्रति १०० किलो वियाणे	६०० ग्रॅ./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि./१०० किलो वियाणे	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	
मका	ज्वारीवरील केवडा, उसावरील केवडा, फिलीपाईन केवडा, तपकिरी पट्टांचा केवडा	बीजोपचार २४० ग्रॅ. प्रति १०० किलो वियाणे	७०० ग्रॅ./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि./१०० किलो वियाणे	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	
मोहरी	पांढरा तांबेरा	बीजोपचार २०० ग्रॅ. प्रति १०० किलो वियाणे	६०० ग्रॅ./ १०० किलो	०.७५ - १.० लि./१०० किलो वियाणे	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	
सूर्यफूल	केवडा (डाउनी मिल्ड्यू)	बीजोपचार २०० ग्रॅ. प्रति १०० किलो वियाणे	६०० ग्रॅ./ १०० किलो	१.० लि./१०० किलो वियाणे	३.५ ते ४ महिने पीक जातीवर अवलंबून	

वापराचे निर्देशन : प्रत्येक एक किलो बियाण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात मैटालेक्सिल ३५ % डब्ल्यू. एस. १०-१२ मिली पाण्यात मिसळा. बियाणे प्लॅस्टिकच्या ड्रम किंवा पिशवी मध्ये घालून जोपर्यंत एकसारखे होत नाही तोपर्यंत ढवळा, (कमीतकमी एक मिनिट)

द्रावणाचे मिश्रण बनविय्याची पध्दत - १) ड्रममध्ये आवश्यक तेवढे पाणी घ्या. पाण्याचे प्रमाण मैटालेक्सिल ३५ % डब्ल्यू. एस. चे प्रमाणाच्या दीडपट जास्त असावे. उपचाराचे इतर कोणतेही उत्पादन असले तरीही सामान्यतः ७५० मि.ली. आणि १००० मि.ली. / १०० किलो पेशा अधिक बीयाणे असू नयेत. २) पाण्यामध्ये मैटालेक्सिल ३५ % मिश्रित प्रमाणात मिसळा. ३) द्रावणाचे मिश्रण न ढवळाही उत्पादन पूर्णपणे मिसळजेवईत थांबावे. ४) द्रावणाचे मिश्रण १० मिनिटे हलवा. आता मिश्रण उपयोगासाठी तयार आहे.

वापर करताना ध्यावायची दक्षता : १) फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापर नये. २) तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. ३) द्रावणाचे मिश्रण वापरत असताना लुघार श्वसनाद्वारे आत घेत नका. ४) फवारणीनंतर दूषित कपडे व शरीराचे भाग भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) द्रावणाचे मिश्रण वापरत असताना धुमपान, खाणे, पिणे अथवा चघळू नये. ६) द्रावणाचे मिश्रण वापरत असताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे, हातमोजे, मुखवटा, चष्मा व बूट वापरावेत.

विषबाधेची लक्षणे : सुस्ती येणे, श्वसनास त्रास, डोळ्यांची जळजळ, स्नायू आडखळे, असामान्य अवस्था

प्रथमोपचार : १) जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असले तर, घरात बोट घालून उलटी करावी हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. २) कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिटे हबके मारावेत. ४) जर श्वसाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा.

पौष्ठावकाशकत : शिफारसीनुसार वापरल्यास मिश्रण वनस्पतीकरीता विषारी नाही.

विषनाशक : कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट : १) रिकाम्या डब्यांचा पुर्नवापर टाळण्यासाठी ते फोडावेत आणि वस्तीपासून दूर मातीमध्ये पुरावेत. २) रिकामे डब्बे पुर्नवापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिकामे डब्बे, राहिलेले साहित्य तसेच यंत्र धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी जेणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये.

सावधानीच्या अटी : १) कितकनाशक सातविण्यात येणार आहे तेथे अनपद्धत व फ्लूआहार किंवा अन्य वस्तू सातविण्याचा जागेपासून दूर जागी व कडीकुलपू असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) ज्या खोलीमध्ये किंवा कपाटामध्ये हे कितकनाशक सातविण्यात येणार आहे ती जागा उत्तम बांधणीची कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडात व पुरेशी मोटी असावी जेणेकरून कोणतेही प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना :

मैटालेक्सील टैक्निकल (१० % व/व वर आधारित)	३८.९ % व/व
वेटिंग एजेंट (स्टीराइल बेन्जीमीडाजोले डाइसल्फोनिक अॅसिड)	३.०० % व/व
डिस्फिंग एजेंट (कॅन्सेलेट ऑफ कार्बनडाईहाईड आणि नैफथेलिन)	७.०० % व/व
फिनोले सल्फोनिक अॅसिड सोडियम सॉल्ट	
स्टीफिंग एजेंट (कार्बोक्सी मिथाईल सैल्फोलेस)	०.२० % व/व
काओलीन, सिलिसिलिक अॅसिड, बॉक (कॅलेशियम कार्बोनेट)	५०.९० % व/व
एकूण: १००.००० % व/व	

निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सव्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरत नाही.

ಎಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35 ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS (ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಎಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35, ಇದು ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಮತ್ತು ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 350 ಗ್ರಾಂ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಸ.ಫ. ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿ ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು :

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ		ತೆಗೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರು (ಲೀ.ಗಲ್ಡ)	ಕೊನೆಯ ಸಂಪದಣಿ ಸಂತರ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಫ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ (ಗ್ರಾಂ)		
ಜೋಳ	ಬೂಬರೋಗ	ಸ್ಪ್ರಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ 200ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	600 ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	3.5-4 ತಿಂಗಳು ತಳಿ ಪ್ರಕಾರ
ಸಜ್ಜೆ	ಬೂಬರೋಗ	ಸ್ಪ್ರಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ 200ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	600 ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	3-3.5 ತಿಂಗಳು ತಳಿ ಪ್ರಕಾರ
ಗೋದಿನಜೋಳ	ಜೋಳದ ಫೊನಿಮಿಲ್ಡ್, ಕಪ್ಪಿನ ಫೊನಿಮಿಲ್ಡ್ ಬಿಲಿಪ್ಪಿನ್ ಫೊನಿಮಿಲ್ಡ್, ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪ್ರಿಪ್ಪೊನಿಮಿಲ್ಡ್ ಬೆಳೆತುಕ್ಕುರೋಗ	ಸ್ಪ್ರಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ 240ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	700ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	3.5-4 ತಿಂಗಳು ತಳಿ ಪ್ರಕಾರ
ಸೂಸಿ	ಬೀಜೋಪಚಾರ	ಸ್ಪ್ರಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ 200ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	600ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	3.5-4 ತಿಂಗಳು ತಳಿ ಪ್ರಕಾರ
ಸೂರ್ಯಕಾಂಠಿ	ಬೂಬರೋಗ	ಸ್ಪ್ರಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ 200ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	600ಗ್ರಾಂ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	0.75-1 ಲೀ/100ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ	3.5-4 ತಿಂಗಳು ತಳಿ ಪ್ರಕಾರ

ಬಳಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ : ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜಕ್ಕೆ : ಪ್ರತಿ ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 10-20 ಮಿಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS ನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹರಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ. ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS ನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪ್ರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 1) ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತುಂಬಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ 1.5 ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 750 ಮಿ.ಲಿ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಒಂದು 1000 ಮಿಲಿ/100 ಕೆಜೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮೀರಬಾರದು. 2) ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್‌ನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. 3) ಅದನ್ನು ಅಲೂಮಿನಿಯಂ ಪರೋಮಾನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿ. 4) ಸಂತರ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ತುಂಬಿ. ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿ ಬಳಸಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರಿಯನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಸಂತರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೆರಗನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂಪಾದ ಬೀಜವು ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿ ಬೀಜ ಇದ್ದರೆ, ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್‌ನಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬೀಜಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ : ಅಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಅಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರ್ಪೆ ಡಬ್ಬೆ, ಪಕು ಅಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ತುಂಬಿದ ಡಬ್ಬೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೂಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಜಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದವರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಪಡೆ ಧರಿಸಿ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಅಲಸ್ಯ, ಉಸಿರಾಡಿದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣು ನೀರು, ಹೆಚ್ಚಿನ, ಸ್ವಾಸೋಶ್ವಾಸದ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಒಂದು ವೇಳೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಟಲಿಗೆ ಬೆರಗು ತರಿಸಿ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಿಸಬೇಡಿ. ದೂಷಿತ ದೇಹದ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿದ್ದರೆ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಸಲ್ಫಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತ್ವಾಕೋರ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುಭ್ರವಾದ ಗಾಳಿಗೆ ತನ್ನಿ.

ಸಹ್ಯ ವಿಕಸಾರ : ಶಿಫಾರಸಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಪೂರ್ವಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಡಿ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಡಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಮಾರ್ಪೆ ಡಬ್ಬೆಗಳ ವಿರೋಧ : ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬೆಗಳು ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜಲಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತತೆವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಹಾಕಿ ಸೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಡಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು : ಉತ್ಪನ್ನವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಧ್ವಜಪಡಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಶೇಖರಿಸಬಹುದಾದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಳು ಇನ್ನು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ನೀರಿನ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಿಲಾಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು.

ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (90.00% w/w ಸ.ಫ ಡ್ರಾಂಟ)	38.90% W/W
ವೆಟಿಂಗ್ ವಿಲೆಂಟ್ -ಸ್ಪ್ರಿಲ್ ಬೆಂಜಿಮಿಡಾಕ್ಸಿಲ್ ಡೈಸಲ್ಫಾಟ್ ಆಮ್ಲ	3.00% W/W
ಡಿಫ್ಫೂಸರ್ ವಿಲೆಂಟ್ : ಕೆಂಡೆನಿಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಮಾಲ್‌ಡೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಪ್ಪೊನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್ ಆಮ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಆಮ್ಲ	7.00% W/W
ಸ್ಟಿಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲೆಂಟ್ : ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಮಿಥೈಲ್ ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್ ಕೆಪೈರೇಟ್, ಸಿಲಿಕಾಟ್ ಆಮ್ಲ, ಟಾಕ್	0.20% W/W 50.90% W/W
ಒಟ್ಟು : 100.00% W/W	

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ.

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ.: 912332644043

ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



An ISO 9001:2015 certified company

ಎಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ 35

ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 35% WS (ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

इलॅक्सील ३५

मैटालेक्सील ३५ प्रतिशत आर्द्र बीजोपचारक (आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್

ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ.

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ.: 912332644043

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सव्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

