

ಸೂಚನಾ : ಪ್ರಯೋಗ ಸೆ ಪಹಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಪತ್ರ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ಪಢೆ । ಪತ್ರಿಕಾ ಮೆ ನಿರ್ದೇಶಾ ನ ಕಿಯೆ ಗಯೆ ಫಸಲ್ಗೊಂಪ ಇಸ್ತೆಮಾಲ ನಾ ಕರೆ । ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್, ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನು, ಗಮನವಿಟ್ತು ಓದಿ.





An ISO 9001:2015 certified company

Elbupro

**Buprofezin 25% S.C.
(Contact Insecticide)**

एलबुप्रो

ब्यूप्रोफेज़ीन २५ प्रतिशत

विलम्बन सान्द्रण

(स्पर्शीय कीटनाशक)

Manufactured by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.,

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,

Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.

Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-138182/2017-Buprofezin (SC) (374)-459

Elbupro

**Buprofezin 25% S.C.
(Contact Insecticide)**

Buprofezin 25% S.C. is an insecticide used for the control of sucking pest of rice, cotton, chillies mango & grapes particularly against plant hoppers, whiteflies, aphids, jassids, thrips, mites, hoppers, mealy bugs etc.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI (gm)	Formulation (Ltr.)		
Grapes Mango	Mealy bugs	250-375	1-1.5	500-1000	7
	Hoppers	0.025 % to 0.05%	1-2ml/liter of water	5-15 litre per tree	20
Cotton Rice	Whiteflies, aphids, jassids, thrips	250	1	500-750	20
	Brown plant hopper, green leaf hopper, white backed plant hopper	200	0.8	400-500	20
Chillies	Yellow mite	75-150	0.3-0.6	500-750	5

Direction of use : a) Preparation of spray mixture : Take the required quantity of insecticide, dilute with a little water and stir well using a stick, then add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again by stirring. b) Plant protection equipments : Use knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer or ASPEE-HTP sprayer. COMPATIBILITY: Buprofezin 25% S.C. is compatible with the commonly used insecticides and fungicides.

Precaution : 1) Avoid inhalation and skin contact while dilution because of spillage's splashes. Do not mix with bare hands. 2) The user should use full protective clothing, which includes rubber boots. Face should be covered with dust mask or respiration and an overall or rubber apron hood or hat. 3) Use in high concentration with low and ultra volume application equipment is a dangerous and should be avoided. LIMITATION AND CAUTIONS FOR USE: Do not use in those situation if there is possibility of harming bees and fish, livestock, game, wild birds and animals.

Symptoms of poisoning : Symptoms may be combination of dizziness, headache, nervousness, anxiety, salivation tremors, convulsions, allergy, localized skin effect like itching, nausea, slight skin erythema and hypoactivity.

First aid : Remove the patient to fresh air. Remove contaminated clothing. If skin is contaminated wash well with soap and water. If eyes are contaminated flush with clean water. Call a physician. If swallowed, induce vomiting.

Phytotoxicity : Buprofezin 25% S.C. is not phytotoxic when used as per recommendations.

Antidote : No specific antidote. Give symptomatic and supportive therapy.

Disposal of used container : 1) The packages or surplus materials and washing from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2) The used package shall not be left outside to prevent re-use. 3) Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions : 1) The package containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for stored other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending on the quantity and nature of insecticide. 2) The store room should be well built, well lit, ventilated and sufficient dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Chemical composition:

Buprofezin	(a.i. content)	25.00 % W/W
Dispersing agent :	(Alkylated naphthalene sulphonate formaldehyde polymer, sodium salt (Propylene glycol)	2.50 % W/W
Antifreeze agent :	(Dimethyl polysiloxane)	12.50 % W/W
Defoamer :	(Xanthum gum) (Hetro polysaccharide)	0.03 % W/W
Thickener 1	(Bentonite clay)	0.10 % W/W
Thickener 2	(1,2-benzisothiazin-3-one)	2.50 % W/W
Bactericide		0.15 % W/W
Distilled water	Q.S.	% W/W

Total : 100.00% W/W

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.

Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-138182/2017-Buprofezin (SC) (374)-459

एलबुप्रो

**ब्यूप्रोफेज़ीन २५ प्रतिशत विलम्बन सान्द्रण
(स्पर्शीय कीटनाशक)**

ब्यूप्रोफेज़ीन २५ प्रतिशत विलम्बन सान्द्रण कीटनाशक है जिसका उपयोग धान, कपास, मिर्ची, आम और अंगूर पर वृष्यकर नुकसान करने वाले कीड़ों विशेषकर पौधे का फुदका, पत्ती का फुदका, सफेद मक्खी, माहू, तेल, चुरदा, धुन, फुदका, दाहिया इत्यादि की रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोग :

फसल	काँट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंनय छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन में)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (लीटर)		
अंगूर	दाहिया	२५०-३७५	१-१.५	५००-१०००	७
आम	फुदका	०.०२५%-०.०५%	१-२ मि.ली./ली. पानी	५-१५ ली./वृक्ष	२०
कपास	सफेद मक्खी, माहू, तेल, चुरदा	२५०	१	५००-७५०	२०
धान	भूरे पौधे का फुदका, हरी पत्ती का फुदका	२००	०.८	४००-५००	२०
मिर्ची	पीला धुन	७५-१५०	०.३-०.६	५००-७५०	५

उपयोग के लिए निर्देश : (अ) छिड़काव धोल की तैयारी : कीटनाशक की निर्धारित मात्रा को पहले धोड़े पानी में अच्छी प्रकार मिलाए उसके बाद पानी की आवश्यक मात्रा जो निर्धारित जो की गयी हो मिलाए और छड़ी या छड़ से अच्छी प्रकार मिलाए। (ब) फसल सुरक्षा यंत्र पीठ पर लालकर, पैर से चलने वाला, दबाव युक्त पीठ पर लाने वाला व शक्ति चालित छिड़काव यंत्र और गेटर स्प्रेयर का प्रयोग छिड़काव के लिए करें। (स) अनुसूचता : ब्यूप्रोफेज़ीन २५ प्रतिशत विलम्बन सान्द्रण आमतौर पर प्रयोग में आने वाले सभी फसलनाशक और कीटनाशक के साथ मिलाया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १) सांस द्वारा अन्दर जाने से या चमड़े के सम्पर्क से दवा मिलाते समय बचावें। कमी भी हाथ से दवा को न मिलायें। २) पूर्णतया सुरक्षित कपड़े का प्रयोग करें। एवं रबड़ का दस्ताना तथा रबड़ का जूता छिड़काव के समय पहनें। चेहरे को नकाब या रेस्पिरैटर से ढके तथा पूरा एग्न जिसमें सर ढकने के लिए हुड को पहने या हैट लगाए। ३) अत्यधिक सान्द्रता का छिड़काव के लिए कम या बहुत कम आयतन वाले यंत्र खतरनाक होते हैं, इसका प्रयोग न करें। प्रयोग की सीमाएँ एवं चेतावनी : अगर मधुमक्खियाँ, मछली, पालतू जानवरों को हानि की सम्भावना न हो तो ऐसे स्थान पर छिड़काव न करें।

विष के लक्षण : यह लक्षण साथ में हो सकते हैं जैसे चक्कर, सरदर्द, धबराहट, बैचेनी, स्थानगत त्वचा असर, जैसे खुजली, चिन्ता, थोड़ी सी त्वचा त्वकरिता और अत्यधिक बैचेनी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : रोगी को बाहर खुली हवा में ले जायें। दूषित कपड़े निकाल दें। यदि त्वचा पर लगे तो पानी और साबुन से अच्छी तरह धो डालिये। आँखों में जाने पर अच्छी तरह स्वच्छ पानी से धोइये। मौन डॉक्टर को बुलायें। निगल जाने पर उल्टी करावें।

पौधविशक्तता : ब्यूप्रोफेज़ीन २५ प्रतिशत विलम्बन सान्द्रण की बतायी गयी मात्रा का प्रयोग करने पर फसल पर असर नहीं पड़ता है।

विष नाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं है। आधारित और लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १) डिब्बे या बचा हुआ सामान और मशीन की धुलाई से आधी धोल तथा अन्य वाहक किसी सुरक्षित स्थान पर फेंके जिससे वातावरण और पानी दूषित हो न सके। २) प्रयोग में आये डिब्बों को बाहर न छोड़ें और न ही दुबारा प्रयोग करें। ३) खाली डिब्बों को लोडफोड कर बस्ती से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें : १) डिब्बे जिसमें कीटनाशक हो उसको किसी अलग कमरे में जिसमें और कोई चीज न रखी जाती हो जैसे खाने पीने की चीजें तथा कमरा थोड़ी दूर में हो या किसी अलग अलमारियों में उसकी मात्रा तथा स्वाभाव के अनुसार ताला लगाकर रखें। २) संग्रहालय अच्छी तरह से बन्ना हुआ हो जिसमें हवा एवं प्रकाश का उचित प्रबन्ध रहे और संग्रहालय का आकार भी ऐसा हो जिसमें काफी जगह हो। कमरे में नमी न हो और ठंडा हो।

रासायनिक संरचना :

ब्यूप्रोफेज़ीन	(सक्रिय तत्व)	२५.०० % भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट	(एलकाइलेट डैटैथलीन सल्फोनेट फार्मिलिहाइड पोलीमर, का सेडियम सॉल्ट)	२.५० % भार/भार
एन्टिफ्रिज एजेंट	(प्रोपॉलिन ग्लाइकॉल)	१२.५० % भार/भार
डिफोमर :	(डाईमिथायल पोलीसिलोक्सेन)	०.०३ % भार/भार
थिकनर १	(जंथम गम) (हेट्रोपॉलिसाकराइड)	०.१० % भार/भार
थिकनर २	(बेन्टोनाइट क्ले)	२.५० % भार/भार
बैक्टेरीसाइड	(१,२-बेंजइसोथायजिन-३-ओन)	०.१५ % भार/भार
आसुत जल	पर्याप्त मात्रा	% भार/भार

योग : १००.००% भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल का करें।

एलबुप्रो**ब्यूप्रोफेझीन २५% एस.सी.****स्पर्शजन्य कटकनाशक**

ब्यूप्रोफेझीन २५% एस.सी. या कटकनाशकाचा उपयोग तांदूळ, कापूस, मिरची, आंबे व दाखांबरील रसशोषणाच्या किडीचे किोषतः टोळ (प्लान्ट हॉपर), हिरवा टोळ, (लीफ हॉपर) पांढऱ्या माशा, मावा, तुडतुडे, फुलकिडे, कोळी, किटक, टोळ, मिलीबग इ. किटकांबर नियंत्रण करण्यासाठी वापरण्यात येते

शिकाऱस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	औषम प्रचाराणी त काढणीपरी वळ (दिग्दर्शक)
		स.तत्व (ग्रॅ.)	संरचना (लीटर)		
द्राक्ष	मिलीबग	२५०-३७५	१-१.५	५००-१०००	७
आंबा	तुडतुडे	०.०२५%-०.०५%	१-२ मि.ली./ली. पानी	५-१५ ली./वृक्ष	२०
कापूस	पांढरी माशी, मावा, तुडतुडे, फुलकिडे	२५०	१	५००-७५०	२०
भात	तपकिरी तुडतुडे, हिरवे तुडतुडे, पांढऱ्या पाठीचे तुडतुडे	२००	०.८	४००-५००	२०
मिरची	पिवळा कोळी	७५-१५०	०.३-०.६	५००-७५०	५

वापराचे निर्देशन : अ) फवारणी मिश्रण तयार करणे : शिकारली प्रमाणे आढळत तेवढे कटकनाशक घ्यावे. थोडेसे पाणी घालून कातीने चांगले ढवळून ते एकजीव करावे. मग फवारणीसाठी जेवढे आहे. तेवढे पाणी घालावे व पुन्हा चांगले ढवळून घ्यावे.
ब) फवारणी उपकरणे : नॅपसेक पंप, फुट पंप, दाब नॅपसेक पंप, नॅपसेक बॅटरी पंप किंवा अस्पी-हिट पंप वापरावे.
क) शिकारसी : ड) (कॉन्फॅटिबिलिटी) मिश्रणशिलात मिसळून वापरता येणे : ब्यूप्रोफेझीन २५% एस.पी. हे सर्व सामान्यप्रमाणे वापरल्या जाणाऱ्या कटकनाशक व बुखीनाशकांबरोबर सुसंगत व सुसंवादी आहे.

इ) फायटोटॉक्सिसिटी : ब्यूप्रोफेझीन २५% एस.सी. शिकारलीनुसार पध्दतीने वापरल्यास झाडांना घातक नाही.

वापर करताना घ्यावयाची दक्षता :

१) फवारणीचे द्रावण बनविताना श्वसनाद्वारे आत धेऊ नका, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी लाकडी काठीचा वापर करा. २) कटकनाशकाचा वापर करताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे, हातमोजे, मुखवटा, चप्पा, मुखवटा, बुट, टोप, रसायन रोधक हातमोजे वापरावेत. ३) कमी आणि अल्ट्रा व्हॉल्यूम उपकरणांसह उच्च एकाग्रतेमध्ये वापरणे धोकादायक आहे आणि ते टाळले पाहिजे. वापरासाठी मर्यादा आणि सावधानीः मधमाश्या आणि मासे, पशुधन, खेळ, कथ पक्षी आणि प्राणी यांना इजा होण्याची शक्यता असल्यास अशा परिस्थितीत वापरू नका.

विषबाधेची लक्षणे : गरमपणे, डोकेदुखी, नर्हसनेस, अस्वस्थता त्वचेवर होणारे परिणाम, मळमळणे, त्वचा लालसर होणे आणि क्रियाशीलता कमी होणे.

प्रथमोपचार : बाधीत व्यक्तीस मोकळ्या वातावरणामध्ये घेवून जा. त्वचेच्या संपर्कात आल्यास तो भाग स्वच्छ पाणी वापरून साबणाने धुवा. डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास स्वच्छ पाण्याने धुवा. लगेचच डॉक्टरांना बोलवा. जर बाधीत व्यक्तीने मिळले असले तर उरटी करावी.

पौधविषाक्तता : ब्यूप्रोफेझीन २५% एस.सी. शिकारलीनुसार वापरल्यास हे उत्पादन रोपविषाकारक नाही.

विषनाशक : कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट : १) ३) रिकामे डबे, राहिलेले साहित्य तसेच मशिन धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी. जेणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये. २) रिकाम्या डब्यांचा पुर्नवापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिकाम्या डब्यांचा पुर्नवापर टाळण्यासाठी ते फोडावेत आणि वस्तीपासून दूर मातीमध्ये पुरावेत.

साठवणीच्या अटी : १) बुखीनाशक रसायन साठविण्यात येणार आहे तेथे अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागोपासून दूर जागी व कडीकुलुप असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) बुखीनाशक साठविण्याची जागा उष्णतेपासून दूर, थंड व कोरड्या जागी ठेवा. साठवणीची जागा मजबूत बांधणीची, पुरेशी लांब, रुंद आणि हवेरीर असावी.

रासायनिक संरचना :

ब्यूप्रोफेझीन	(स. त.)	२५.०० % व/व
डिसपर्सिअ एजेन्ट	(एल्काईलेटेड नैथलीन सल्फोनेट फॉर्मलिडहाइड	२.५० % व/व
	पॉलीमर चे सेडिमेंट)	
एन्टिक्रिझ एजेन्ट	(प्रोपालिन ग्लाइकोल)	१२.५० % व/व
डिमोमर :	(डाईमिथायल पॉलीसिलोक्सेन)	०.०३ % व/व
थिकनर १	(जंथम गम) (हेट्रोपालिसिखराइड)	०.१० % व/व
थिकनर २	(बेन्टोनाइट क्ले)	२.५० % व/व
बॅक्टेरीसाइड	(१,२-बॅजअइसोथायजिन-३-ओन)	०.१५ % व/व
आर्जल जल	उर्वरित प्रमाण	% व/व

योग: १००.०० व/व**निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,**

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १११/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

ಎಲ್‌ಬುಪ್ರೋ**ಬುಪ್ರೋಫೆಝಿನ್ 25% ಇ.ಸಿ****ಕೀಟನಾಶಕ**

ಬುಪ್ರೋಫೆಝಿನ್ 25% ಇ.ಸಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಭತ್ತ, ಹತ್ತಿ, ಮೀಸು, ಮಾವು ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ರಸಪೇರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಜಿಗ್ಮಿಹಳೆ, ಎಲೆ ಜಿಗ್ಮಿಹಳೆ, ಬಿಳಿನೋಣ, ಅಫಿಡ್, ಜ್ಯೂಸಿಡ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸುಗಲು, ಜಿಗ್ಮಿಹಳೆ, ಒಟ್ಟು ತಿಗಣಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಅ) ಸಂಪರಣಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು: ಅವಶ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಲಕೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸುತ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಪರಣಾ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕದಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರಿ.

ಆ) ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಯರ್, ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೇಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೇಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರೀ ಸ್ಟೇಯರ್, ಆಸ್ಪ್ರಿ ಪಿಚ್ ಟಿಪಿ ಸ್ಟೇಯರ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು	ಕೀಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತೀ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಫ. (ಗ್ರಾಂ.)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕಾದ ನೀರು (ಲೀ.)	
ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮಾವು	ಒಟ್ಟು ತಿಗಣಿ ಜಿಗ್ಮಿಹಳೆ	250-375	1-1.5	500-1000	7
ಹತ್ತಿ	ಬಿಳಿನೋಣ ಅಫಿಡ್ ಜ್ಯೂಸಿಡ್ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ತಿಗಣಿ	0.025%ದಿಂದ 0.05%	1-2 ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ರತೀ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ	5-15 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತೀ ಮರಕ್ಕೆ	20
ಭತ್ತ	ಕಂದು ಜಿಗ್ಮಿಹಳೆ ಹಸಿರು ಜಿಗ್ಮಿಹಳೆ ಜೆನ್ನಿಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿ ಇರುವ ಜಿಗ್ಮಿಹಳೆ	200	0.8	400-500	20
ಮೀಸು	ಹಳದಿ ನುಸಿ	75-150	0.3-0.6	500-750	5

ಇ) ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಬುಪ್ರೋಫೆಝಿನ್ 25% ಇ.ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ) ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಬುಪ್ರೋಫೆಝಿನ್ 25% ಇ.ಸಿ ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗದ ಸೂಚನೆಗಳು: ಶೇಖರಣೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನ್ನು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು-ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು- ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಛಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಗಾಳಿಬೆಳಕಾದುಮಂಡಿರಬೇಕು. ಒಣದಾಗಿರಬೇಕು. ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಕಂಟೇನರ್ ವಿಪರ್ಜನವು: 1) ಪ್ರಾಕೇಟುಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣದ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಮಕರೇಣ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ದೂಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಲಿಸಬೇಕು. 2) ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬರಿದಾದ ಪ್ರಾಕೇಟುಗಳನ್ನು ಹೊಗೆ ಇರಿಸಬಾರದು.3) ಪ್ರಾಕೇಟುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಸತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಲದಡಿಯ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ದೂಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲದ ಹೊತ್ತುಬಿಡಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಮುನ್ನಿಚ್ಛರಿಕೆಗಳು: 1) ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಚೆಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಚೆಮ್ಮದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. 2) ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲವ್ಸ್, ರಬ್ಬರ್ ಬೂಡುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪುಗಳು ಧರಿಸಬೇಕು. ಮುಖವನ್ನು ಡೆಸ್ಟಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿರೇಟರ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ರಬ್ಬರ್ ವಿಪರ್ಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೇಟು ಧರಿಸಬೇಕು. 3) ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪರಣೆಗಾಗಿರುವ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಯಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಬರಿಸಬೇಕು. 2. ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಕಳಚಿ ತಗಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಾಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾಬೂನು ನೀರು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನೀರು ಎರಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಬಳಸಲು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸುರಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪದ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆ:	ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
ಬುಪ್ರೋಫೆಝಿನ್ ಸ.ಫ. ಪ್ರಮಾಣ	25.00%
ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಅಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ನಫ್ಥಾಲಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ	
ಫಾರ್ಮಿಲ್‌ಡಿಹೈಡ್ ಸಾಲಿಮರ ಸೋಡಿಯಮ ಸಾಲ್ಟ್)	2.50%
ಅಂಟಿಫೀಜಿ ಏಜೆಂಟ್ (ಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್)	12.50%
ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಮರ್ (ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಾಲಿಸಿಲೋಕ್ಸಿನ್)	0.03%
ಥಿಕನರ್ 1 (ಕೆನ್‌ಥಾಮ್ ಗಮ್) (ಹೆಟರೊಪಾಲಿ ಸಕ್ಟರೀಡ್)	0.10%
ಥಿಕನರ್ 2 (ಬೆನ್‌ಟೊನೈಟ್ ಕ್ಲೇ)	2.50%
ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಸೈಡ್ (1.2 ಬೆನ್‌ಝಿಮಿಥಿಯಾಝಿನ್-3-ವನ್)	0.15%
ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ
	ಒಟ್ಟು 100.00%

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ.

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ.: 912332644043

ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

**ಎಲ್‌ಬುಪ್ರೋ****ಬುಪ್ರೋಫೆಝಿನ್ 25% ಇ.ಸಿ****ಕೀಟನಾಶಕ****एलबुप्रो****बूप्रोफेझीन २५% एस.सी.****स्पर्शजन्य कटकनाशक****ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,**

ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ

ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ.

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १११/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

