

Recommendation : For use as a plant growth regulator in mango.
Direction of use : Wear protective clothing, head dress and face mask. **Precaution :** 1) Do not smoke, drink or eat while using this product. 2) Keep out of the reach of the children. 3) Wear protective gloves when handling the concentrate. 4) Wash concentrate from skin or eyes immediately. 5) Wash hands and exposed skin before meals and after work. 6) Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemicals or used container. 7) Keep in original container tightly closed in a safe place.

Antidote : Treat symptomatically.

First aid : Induce vomiting by tickling the back of throat.

Medical treatment : If ingested give gastric lavage with care to prevent aspiration.

Symptoms of poisoning : Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations.

उपयोग : आम में पौध विकास क्रम व्यवस्थापक के प्रयोग के लिए मात्रा एवं विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न पर्चा देखें। **उपयोग के लिए निर्देश :** पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहने। सिर व मुँह को ढक कर रखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) बच्चों की पहुँच से दूर रखें। २) संप्रत द्रव्य का प्रयोग दस्ताने पहन कर करें। ३) प्रयोग के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ४) रसायन को त्वचा व आँखों पर से तुरंत धो दें। ५) प्रयोग के बाद और खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें। ६) नाली, तलाबों तथा पानी के स्रोतों को प्रयोग किए गए खाली डिब्बों और रासायनिक तत्व से दूषित न करें। ७) कीटनाशक को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर और ढक्कन बंद कर रखें। **विषनाशक :** लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** गले में उँगली डालकर उल्टी करवाएं। यदि निगल गया हो तो अमाशय साफ करें (गैस्ट्रिक लॉवेंज)। ध्यान रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छवास के साथ अन्दर न जाने पायें।

लक्षण : स्नायुदुर्बलता, व्यग्रता, कंपन एवं एलर्जी के लक्षण।

Please read enclosed leaflet carefully before use.

Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रयोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रतिक्रिया में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल न करें।
 ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರಕುಶಲರಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ.

CIR-116533/2014-Paclobutrazol (SC) (351)-19

Paclobutrazol 23% W/W (25% W/V) S.C. (Plant Growth Regulator)

पैक्लोबूट्राजोल २३% भार/भार
(२५% भार/आयतन) एस. सी.
(पौध विकास नियन्त्रक)



PACLOBOOST®

ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬೂಸ್ಟ್ ಪೆಕ್ಲೋಬೂಸ್ಟ್



ELANTA® An ISO 9001:2015 certified company **एलंटा®**

Chemical Composition :

Paclobutrazol a.i.	23.00 % W/W	रासायनिक संरचना:	पैक्लोबूट्राजोल सक्रिय तत्व	२३.०० % भार/भार
Alkylated naphthalene sulphonate sodium salt	3.00 % W/W		अल्काइलेटीड नेफ्थालीन सल्फोनेट	३.०० % भार/भार
Xanthan gum	0.03 % W/W		सोडियम लवण	
Sodium bentonite/	2.50 % W/W		जैन्थेम गोंद	०.०३ % भार/भार
Aluminium silicate			सोडियम बेन्टोनाईट/	२.५० % भार/भार
Polydimethyl	0.3 % W/W		ऑल्युमिनियम सिलिकेट	
siloxanes + silica			पॉलीडाईमिथाईल	०.३ % भार/भार
Benzisothiazolin-3-one	0.01 % W/W		सीलोकसेन + सीलिका	
Propylene glycol	5.00 % W/W		बैन्जआईसोथायज़ोलीन-३-वन	०.०१ % भार/भार
Water	Q.S. % W/W		प्रोपीलीन ग्लाइकोल	५.०० % भार/भार
			पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
Total : 100.00 % W/W				योग : १००.०० % भार/भार

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-116533/2014-Paclobutrazol (SC) (351)-19

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : LCIM0320220025

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.,

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagrosangli@gmail.com **Cust. care no.:** (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.

Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





PACLOBOOST


Paclobutrazol 23% W/W
(25% W/V) S.C.
(Plant Growth Regulator)

पैक्लोबूस्ट

पैक्लोबूट्राजोल २३% भार/भार
(२५% भार/आयतन) एस. सी.
(पौध विकास नियन्त्रक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-116533/2014-Paclobutrazol (SC) (351)-19

PACLOBOOST

Paclobutrazol 23% W/W (25% W/V) S.C.
(Plant Growth Regulator)

It is containing paclobutrazol is a systemic growth regulator discovered by ZENCA, U.K. its principal mode of action is the inhibition of gibberellin biosynthesis The compound is taken through stem tissue or roots and is translocated to the site of action in sub-apical meristems tree vigour is controlled by reducing the internodes lengths of new shoots and earlier formation of terminal buds. Fruit bud production, fruit color and harvest yield can also be favorably influenced.

Recommendation : Note : If the soil is sandy, the rate of application may be reduced to 75 % of the quantity recommended. For repeat use in the treeted orchards, the rate of its application in subsequent years can be 50-75% of the first years. Ingate lightly soon after application and subsequently irrigate once or twice a month.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest
		Al	Formulation		
Mango tree	Age 7-15 years	-	15 ml	-	-
	Age 16-25 years	-	20 ml	-	-
	Age more than 25 years	-	25-40 ml	-	-

Direction of use : Recommended for mature mangoes only (at least 7 years old) Recommended quality of paclobutrazol to be diluted in clean water of (5-10 litres) and applied in furrow 5 cm to 10 cm deep, about 30 cms away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil- collar drench.

Time of application : Applied after the harvest of fruits any time from July to Oct will be ideal

Precaution : Do not smoke, drink or eat while using this product.

- 1) Keep out of the reach of the children.
- 2) Wear protective gloves when handling the concentrate.
- 3) Do not smoke, drink or eat while using the product.
- 4) Wash concentrate from skin or eyes immediately.
- 5) Wash hands and exposed skin before meals and after work.
- 6) Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemicals or used container
- 7) Keep in original container tightly closed in a safe place.

Symptoms of poisoning : Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations.

First aid : induce vomiting by tickling the back of throat.

Medical treatment : If ingested give gastric lavage with care to prevent aspiration.

Antidote : Treat symptomatically.

Disposal of used container :

- 1) The package shall be cut or crushed and buried away from the habitation.
- 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- 3) Package, surplus material and washing should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage conditions : 1) The package containing the plant growth regulator shall be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2) The rooms or premises meant for the plant growth regulator shall be well built, dry, ventilated and of sufficient dimension.

Chemical composition :

Paclobutrazol a.i.	23.00 % W/W
Alkylated naphthalene sulphonate sodium salt	3.00 % W/W
Xanthan gum	0.03 % W/W
Sodium bentonite / Aluminium silicate	2.50 % W/W
Polydimethyl siloxanes + silica	0.3 % W/W
Benzisothiazolin-3-one	0.01 % W/W
Propylene glycol	5.00 % W/W
Water	Q.S. % W/W
Total : 100.00 % W/W	

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-116533/2014-Paclobutrazol (SC) (351)-19

पैक्लोबूस्ट

पैक्लोबूट्राजोल २३% भार/भार (२५% भार/आयतन) एस. सी.

(पौध विकास नियन्त्रक)

यह सक्रिय तत्व पैक्लोब्यूट्राजोल है एक अन्तःप्रवाही पौध विकासक्रम व्यवस्थापक है। इसका आविष्कार जेनेका यूके ने किया है। इसकी मूल कार्य रीति जिब्रेलिन बायोसिन्थेसिस को रोकना है।

यह रसायन तने के तन्तुओं या जड़ों के द्वारा उप शिखर प्रगतिशील उत्तकों तक पहुंचता है और इसकी मुख्य क्रिया की जगह है। ये नई कोपलों के बीच की दूरी को कम करता है इसमें अंतिम अंकुर या कली जल्दी बनती है। और इस प्रकार पेड़ की तीव्रता को नियंत्रित करता है। इसका फल अंकुर उत्पादन फल के रंग और फसल की उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

उपयोग : नोट यदि जमीन रेतेली है तो रसायन की सिफारिश की गई मात्रा को ७५ प्रतिशत कर दें। कल्टार प्रयोग किये गये बागानों में आने वाले सालों में प्रयोग के लिये पहले साल प्रयोग की गई मात्रा के मुकाबले कल्टार की मात्रा में ५०-७५ प्रतिशत की कमी की जा सकती है। प्रयोग के बाद हल्की सिचाई करें और फिर माह में एक या दो बार सिचाई करें।

फसल	कॉट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल
		स. तत्व	संरचना		
आम के पेड़	आयु ७-१५ साल	-	१५ मि.ली.	-	-
	आयु १६-२५ साल	-	२० मि.ली.	-	-
	आयु २५ साल से ज्यादा	-	२५-४० मि.ली.	-	-

उपयोग के लिए निर्देश : केवल परिपक्व आमों के लिए (कम से कम सात साल पुराने) प्रयोग करने का तरीका : सिफारिश की गई पैक्लोब्यूट्राजोल की मात्रा को ५-१० लीटर साफ पानी में मिलाएँ और तने से ३० से.मी. दूर एक ५-१० से.मी. गहरी नाली खोद कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से एक दें या तने के चारों ओर अच्छी तरह से डालकर पूरी तरह मिगे दें।

प्रयोग का समय : आम की फसल लेने के बाद प्रयोग करें। जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय अति उपयुक्त

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : प्रयोग के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।

१) बच्चों की पहुँच से दूर रखें। २) संप्रत द्रव्य का प्रयोग दस्ताने पहन कर करें। ३) प्रयोग के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ४) रसायन को त्वचा व आँखों पर से तुरंत धो दें। ५) प्रयोग के बाद और खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें। ६) नाली तलाबों तथा पानी के खेतों को प्रयोग किए गए खाली डिब्बों और रासायनिक तत्व से दूषित न करें। ७) कीटनाशक को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर व ढक्कन बंद कर रखें।

विष के लक्षण : स्नायुदुर्बलता, व्यग्रता, कंपन एवं एलर्जी के लक्षण।

प्राथमिक चिकित्सा : गले में उँगली डालकर उल्टी करवाएँ। यदि निगल गया हो तो अमाशय साफ करें (मैस्ट्रिक लावेज)। ध्यान रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छवास के साथ अन्दर न जा पायें।

विष नाशक : लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १) खाली डिब्बों, को अच्छी तरह लोड फोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) खाली डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंकें जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। ३) डिब्बों या बची हुई रसायन तथा यंत्रों के धोवन का इस प्रकार निपटारा करें की आसपास के वातावरण तथा पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तें : १) पौध विकास कम व्यवस्थापक को मूल डिब्बे में रखें। संग्रहण के लिए प्रयुक्त कमरें या स्थान, अन्य सामान के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों से अलग से अलग ताला बंद अलमारी में रखें। २) कीटनाशक संग्रहण के लिए बने कमरें या स्थान ठीक सूखे, हवादार, प्रकाशित व लम्बे-चौड़े हों।

रासायनिक संरचना :

पैक्लोब्यूट्राजोल सक्रिय तत्व	२३.०० % भार/भार
एलकाईलेट डी नैथालीन सल्फोनेट सोडियम लवण	३.०० % भार/भार
जैन्थेम गोंद	०.०३ % भार/भार
सोडियम बेनटोनाईट/एल्यूमीनियम सीलिकेट	२.५० % भार/भार
पोलीडाईमिथाईल सीलोकसेन+सीलिका	०.३ % भार/भार
बैन्जोआइसोथायाजोलीन-३-वन	०.०१ % भार/भार
प्रोपीलीन ग्लाइकोल	५.०० % भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग : १००.०० % भार/भार	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

पॅकलोब्रस्ट

पॅकलोब्रुट्राजोल २३% व/व (२५% व/अ) एस. सी.

(रोप वाढ उत्प्रेरक)

यामध्ये पॅकलोब्रुट्राजोल हे आंतरप्रवाही सक्रिय वृद्धिनिर्धक असून याचा शोध झेनेका युके यांनी केला आहे. याचे प्रमुख कार्य वनस्पती मध्ये जिब्रेलीन तयार होण्याच्या कार्य पद्धतीवर नियंत्रण ठेवणे हे आहे. याचे शोषण वनस्पतीच्या खोडावरील पेशी किंवा मुळावरील पेशींद्वारे होते. व त्यानंतर याचे वहन वनस्पतीच्या वरील भागातील पेशीमध्ये ज्या ठिकाणी गरज आहे. अशा ठिकाणी होते.

नविन येणाऱ्या फुटीच्या खोडावरील पेरांची लांबी कमी करून वनस्पतीची वाढ नियंत्रीत करते. तसेच कळी लवकर निघण्यासाठी मदत करते. फळांचा लाग, कळी येण्याचे प्रमाण, फळांचा रंग आणि उत्पादन यावर अनुकूल परिणाम करते.

शिफारस :

सूचना : जर जमीन वाळू मिश्रीत असेल तर शिफारशीपेक्षा ७५% प्रमाण कमी करून वापरणे. वापरलेल्या झाडामध्ये पुर्नवापर करताना पहिल्यांदा वापरलेल्या प्रमाणापेक्षा ५०% - ७५% प्रमाण वापरणे. वापर केल्यानंतर हलके पाणी घावे व त्यानंतर महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा गरजेनुसार पाणी घावे.

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण	अंतिम क्वाग्रीती ते काढणीपर्यंत वेळ
		स. तत्व	संरचना		
आंबा	झाडाचे वय ७-१५ वर्षे	-	१५ मि.ली.	-	-
	झाडाचे वय १६-२५ वर्षे	-	२० मि.ली.	-	-
	झाडाचे वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त	-	२५-४० मि.ली.	-	-

वापरासाठी निर्देश : फक्त परिपक्व झालेल्या आंब्याच्या झाडावरती याचा वापर करावा. (झाडाचे वय कमीत कमी ७ वर्षे असावे)

शिफारस : पॅकलोब्रुट्राजोल ची मात्रा ५ ते १० लिटर स्वच्छ पाण्यात मिसळून घ्यावी आणि ५ ते १० से. मी. च्या सरीमध्ये झाडच्या खोडा पासून कमीत कमी ३० से. मी. इतक्या लांब अंतरावर वापरावे व त्या नंतर सरी मातीने भरून घ्याव्यात.

वापराणेचा कालावधी : परिपक्व फळांची काढणी झाल्यानंतर वापरावे. जुलै ते ऑक्टोबर या काळात वापरण्यास योग्य.

वापर करताना ध्यावयाची दमता : १) लहान मुलांपासून दूर सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. २) रसायनाचा वापर करताना सुरक्षिततेसाठी हातमोज्यांचा वापर करावा. ३) रसायनाचा वापर करताना करताना धुसपान, खाणे, पिणे अथवा चघळू नये. ४) रसायनाच्या संपर्कात आलेली त्वचा व डोळे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) रसायनाचा वापर केल्यानंतर व जेवण करण्याआधी हाथ आणि संपर्कात आलेली त्वचा भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ६) वापरानंतर रिकाम्या झालेल्या डब्यांमुळे तलाव, पाण्याचे खोत यामध्ये राहिलेले अवशेष मिसळून पाणी प्रदूषित होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. ७) राहिलेले रसायन त्यांच्या मूळ डब्यांमध्ये घट्ट झाकण लावून सुरक्षित ठिकाणी ठेवा.

विषवायेची लक्षणे : अस्वस्थता, चिंता, व्यग्रता, कंपन तसेच अॅलजी यासारखे लक्षणे दिसतात.

प्रथमोपचार : १) जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असले तर, घशात बोट घालून उलटी करावी हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. २) रोगी पाणी पिऊ शकत असेल तर 'गॅस्ट्रीक लव्ज' देवून जठर साफ करावे.

विषनाशक : कोणताही विषाइट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विळेवाट : १) रिकामे डबे मोडून- तोडून वस्तीपासून लांब जमिनीमध्ये पुरा. २) रिकाम्या डब्यांचा पुर्नवापर होउ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिकामे डबे, राहिलेले साहित्य तसेच मशिन धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विळेवाट योग्य रितीने लावावी. जेणेकरून पर्यावरण दूषित होउ नये.

साठवणीच्या अटी : १) रसायनांची साठवण त्यांच्या मूळ डब्यांतच करावी तसेच साठविण्यात येणार आहे ती जागा अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागेपासून दूर जागी व कडीकुलुप असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) ज्या खोलीमध्ये किंवा कपाटामध्ये हे रसायन साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोटी असावी, त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदुषण टक्के.

रासायनिक संरचना :

पॅकलोब्रुट्राजोल सक्रिय तत्व	२३.०० % व/व
अल्कॉलेलेटिड नेथेथालीन सल्फोनेट सोडियम लवण	३.०० % व/व
जॅन्थेम गम	०.०३ % व/व
सोडियम बेनटोनाईट/ॲल्युमीनियम सीलिकेट	२.५० % व/व
पोलीडाईमिथाईल सीलोक्सेन+सीलिका	०.३ % व/व
बैन्जआईसोथायजोलीन-३-वन	०.०१ % व/व
प्रोपीलीन ग्लाइकोल	५.०० % व/व
पाणी	उर्वरित प्रमाण % व/व
एकूण : १००.०० % व/व	

निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

प्याक्लोबुरास्

प्याक्लोबुराट्राजोल २३% डब्ल्यू/डब्ल्यू (२५% डब्ल्यू/प्लू) ಎಸ್.ಸಿ.

(ಸಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ)

ಡಬ್ಬೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

ಇದು ಪ್ಯಾಕ್लोಬುಟ್ರಾಜೋಲ್‌ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬುಟ್ರಾಜೋಲ್ ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದ್ದು ಇವರಿಂದ ಸಂತೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜೆಬರಲಿಸ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಅತಿಶೀಘ್ರ ಮರಿಸ್ಸಿಮ್ ಇಂಟೆಕ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೋಡಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬೇಗನೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊಗ್ಗು ಬಿಡುವಿಕೆ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಭಾವಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಸೂಚನೆ : ಮರಳುಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ (ಶಿಪಾರಿಸಿನ 75% ರ ವರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು) ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದ 50-75% ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎರಡನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಳುವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ನೀರು ಕೊಡಿ.

ಬೆಳೆ	ಗಿಡದ ವಯೋಮಾನ	ಪ್ರಮಾಣ/ ಹೆಕ್ಟರ		ಬೆರಸಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ನಡುವೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ. ಫ.	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್		
ಮಾವಿನ ಗಿಡ	7-15 ವರ್ಷ 16-25 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಮಿಲ್ಲು		15 ml 20 ml 25-40 ml		

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ :

ಪರಿಪಕ್ವ ಮಾವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ (ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷ ಅಯುಷ್ಯದ) ಶಿಪಾರಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಪಾರಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬುಟ್ರಾಜೋಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ (5-10 ಲೀಟರ್) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಗಿಡದಿಂದ 30 ಸೆ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ಸೆ.ಮೀ ಅಳವಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವೇಳೆ :

- ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೊಯಲಿನ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಧಿ. **ಮುಂಚಾಗಿದ್ದರೆ :** ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಸೇರುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 1) ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಏಟಿಕದಂತೆ ಇಡಬೇಕು. 2) ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಕವಚ / ಗೃಹ ಧರಿಸಿ. 3) ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 4) ಉಟದ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂರಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೆನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5) ಪಾಕ ಉಳಿದ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನೀರಿನಿಂದ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಹೊಂದ, ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ದೂಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. 6) ಓರಿಜನ್ ಡಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಪಾಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. **ವಿಷವಾಢೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ನರ್ವಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಥಾಯಿ ದುರ್ಬಲತೆ, ನಡಕ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು. **ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ :** ಗಂಟಲಿಗೆ ಬೆರಳು ಪಾಕ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಿಸಿ. **ಮಿಡಿಕಲ್ ಟ್ರಿಟ್ಮೆಂಟ್ :** ಒಂದು ವೇಳೆ ನುಂಗಿದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಂಜು ಮಾಡಿಸಿ. ಹೊರಬಳುವ ಪದಾರ್ಥ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚಾಸದ ಜೊತೆ ಒಳ ಸೇರದವಾಗ ಲಕ್ಷಕೊಡಿ. **ಪ್ರತ್ಯಾಪಧಿ :** ಲಕ್ಷಣದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕೊಡಿ. **ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಡಬ್ಬೆಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ :** 1) ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಜನಪ್ರಸಾರಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೊಳೆಬೇಕು. 2) ಡಬ್ಬೆಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗದಿರಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. 3) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಗದಂತೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. **ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು :** 1) ಸಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಹೊಂದಿದ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಡಬ್ಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಅಲೇಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೀಗಪಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. 2) ಸಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಹೊಂದಿದ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವ ಜಾಗ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ, ಮತ್ತು ಏಸಾರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನೆ

ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬುಟ್ರಾಜೋಲ್ ಸ.ಫ.	23.00%	ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ
ಅಲ್ಕಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ಫಿಲಿಸ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್	3.00%	ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗಮ್	0.03%	ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ
ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಟೋಸೈಟ್/ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ	2.50%	ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ
ಪಾಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್ + ಸಿಲಿಕಾ	0.30%	ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ
ಬೆಂಜಿಲೋಥೈರೋಲಿಸ್-3-ವನ್	0.01%	ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ
ಪ್ರೊಪಿಲಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್	5.00%	ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ
ನೀರು	0.30%	ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ
ಒಟ್ಟು : 100.00% ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ		

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಣಾನನ ಪೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರಬ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ: 912332644043

ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



An ISO 9001:2015 certified company

ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬುರಾಸ್

ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬುಟ್ರಾಜೋಲ್ 23% ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ

(25% ಡಬ್ಲೂ/ಪ್ಲಿ) ಎಸ್.ಸಿ.

(ಸಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ)

पॅकलोब्रस्ट

पॅकलोब्रुट्राजोल २३% व/व

(२५% व/घ) एस. सी.

(रोप वाढ उत्प्रेरक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ವಿಶ್ರಾಮ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಣಾನನ ಪೌಸಿಂಗ್

ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರಬ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ: 912332644043

निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

