

Recommendation : It is recommended for use in paddy, cotton, sugarcane, groundnut, brinjal, bhendi, grapes, etc. for better yield. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precaution :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First aid :** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms :** Please read enclosed leaflet before use.

उपयोग : इसे चावल, कपास, गन्ना, मूंगफली, बैंगन, भिण्डी, अंगूर आदि फसलों की अच्छी खाद के लिए उपयोग करते हैं। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खादसामग्री, खाद सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **लक्षण :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।

Please read enclosed leaflet carefully before use.

Caution : Not to be used on crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।



CIR-111101/2014-Gibberellic Acid (L) (344)-38

GIBBERELIC ACID 0.001% L
Plant Growth Regulator

जिब्रेलिक एसिड ०.००१% एल.
पौध विकास नियन्त्रक



SEAGREEN[®]
Super
सिग्रीन सुपर

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.

CAUTION
सावधान

Keep out of
reach of
children

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें।



An ISO 9001:2015
certified company



Chemical composition :

Gibberellic acid .a.i. (Based on 0.001 % W/W	
purity 100% a.i. W/W)	
Protein (hydrolysed)	2.5 % W/W
yeast extract seaweeds	3 % W/W
(Marina brown algae extract)	
Feso ₄ 7H ₂ O (Min 95%)	2.3 % W/W
Mnso ₄ 3H ₂ O (Min 90%)	1.4 % W/W
Znso ₄ 7H ₂ O (Min. 95%)	3.9 % W/W
Mgso ₄ 7H ₂ O (Min 90%)	4.3 % W/W
EMULSIFIER Tween 80	1 % W/W
(Sorbital mono Oleate)	
Solvent (Water)	Q.S % W/W

Total : 100 % W/W

रासायनिक संरचना:

जिब्रेलिक एसिड ०.००१ प्रतिशत एल	०.०१ % भार/ भार
(शुद्धता पर आधारित १०० प्रतिशत)	
प्रोटीन (जलअपघटित)	२.५ % भार/ भार
समुद्री धासपात	३ % भार/ भार
(मरीना ब्राउन आल्गी एक्स्ट्रैक्ट)	
एफएसओ ४ ७ एच २ ओ (न्यूनतम ९५)	२.३ % भार/ भार
एमएनएसओ ४ ३ एच २ ओ (न्यूनतम ९०)	१.४ % भार/ भार
जैडएमएसओ ४ ७ एच २ ओ (न्यूनतम ९५)	३.९ % भार/ भार
एमजीएसओ ४ ७ एच २ ओ (न्यूनतम ९०)	४.३ % भार/ भार
एमलिसिफर	१ % भार/ भार
टविन ८० (सारबिटल मोनो	प्रत्यक्ष मात्रा % भार/ भार
ओलियट) विलायक (पानी)	

योग: १००.०० % भार/ भार

Regn. No. / रजि.नं. : CIR-111101/2014-Gibberellic Acid (L) (344)-38

Mfg. Lic. No. / मैनु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैनु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (समी करें सहित)

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.,

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate,
Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagrosangli@gmail.com Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.

Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





An ISO 9001:2015 certified company

Seagreen Super

Gibberellic Acid 0.001%L

(Plant Growth Regulator)

सिग्रीन सुपर

जिबरेलिक एसिड ०.००१ प्रतिशत एल

(पौध विकास नियन्त्रक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-111101/2014-Gibberellic Acid (L) (344)-38

Seagreen Super

Gibberellic Acid 0.001%L

(Plant Growth Regulator)

Gibberellic acid 0.001% L is a highly effective plant growth regulator containing gibberellic acid 0.001% as active ingredient. Gibberellic Acid 0.001% L acts synergistically with plant metabolism and accelerates the growth functions of the plant. Also improves the physiological efficiency of the crop by simulating the hormonal and enzymatic activities and increases the yield and quality of the crop produce.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest
		AI (gm)	Formulation (ml)		
Grapes	First : 30-35 days after pruning Second : During the match head stage	0.018	180	450-500	2
Cotton	First spray : 40-45 DAP Second spray : at the time of boll formation.	0.018	180	450-500	2
Banana	First spray : 3rd month Second spray : 5th month.	0.027	270	450-500	
Sugarcane (Planted crop)	Third spray : At the time of fruit formation	0.018	180	450-500	2
Paddy	First spray : 40-45 DAP Second spray : 75-80	0.018	180	450-500	1
	Short duration varieties : 20-25 DAT Medium duration varieties : 30 -35 DAT Long duration varieties : 40-45 DAT	0.018	180	450-500	2
Cabbage / Cauliflower	First spray : 45 DAS Second spray: 65 DAS	0.018	180	450-500	1
Onion	25-30 days after planting	0.045	450	450-500	3
Brinjal / Bendi	First spray : 34 DAP, Second spray : 70 DAP Third spray : 105 DAP	0.018	180	450-500	1
Ground nut	30-35 days after sowing Second spray : At the time of flowering	0.018	180	450-500	1
Muberry	First spray 15-20 days after harvest Second spray : 25-30 days after first spray	0.045	450	450-500	2

Direction of use : Plant protection equipment : Gibberellic acid 0.001% L can be sprayed in the field for high volume spraying using the equipments like bucket sprayer, stirrup pump sprayer, foot sprayer, wheel barrow sprayer, knapsack sprayer. Compression knapsack sprayer. Compression knapsack battery sprayer or ASPEE HTP power sprayer. For low volume spraying use knapsack mist blower cum duster. Preparation of spray solution: Mix the required quantity of gibberellic acid 0.001% L at the rate of 1 ml in 1 litre of water and further diluted in 180-200 litres of water per acre for the preparation of spray solution. Compatibility: gibberellic acid 0.001% L is compatible with all commonly used fertilisers, insecticides, herbicides and fungicides except Bordeaux mixture. **Time of application :** Gibberellic acid 0.001% L is to be diluted at the rate of 1 ml in one litre of water and sprayed uniformly on the foliage to cover all parts of the plant. Gibberellic acid 0.001% L shall be sprayed during the cool hours of the day. Repeat the application if there is rain within six hours of spraying. Shake the bottle well before using the product. **Precaution :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Symptoms of poisoning :** Headache, nausea, vomiting, skin and eye , irritation may occur. **First aid :** 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote :** No psecific antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal of used container :** The packages shall be broken and burned away from habitation. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. The used packages or surplus material and washing from the equipment should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental or water pollution. **Storage conditions :** The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the material. The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well-til, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical composition :

Gibberellic acid .a.i. (Based on purity 100% a.i. W/W)	0.001 % W/W
Protein (hydrolysed)	2.5 % W/W
yeast extract seaweeds (Marina brown algae extract)	3 % W/W
Feso. 7H ₂ O (Min 95%)	2.3 % W/W
Mnso. 3H ₂ O (Min 90%)	1.4 % W/W
Znso. 7H ₂ O (Min. 95%)	3.9 % W/W
Mgso. 7H ₂ O (Min 90%)	4.3 % W/W
EMULSIFIER Tween 80 (Sorbital mono Oleate)	1 % W/W
Solvent (Water)	Q.S % W/W

Total : 100.00 % W/W

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-111101/2014-Gibberellic Acid (L) (344)-38

सिग्रीन सुपर

जिबरेलिक एसिड ०.००१ प्रतिशत एल
(पौध विकास नियन्त्रक)

जिबरेलिक एसिड ०.००१ प्रतिशत एल एक अत्यन्त प्रभाकारी वनस्पती विकास - नियामक है। इसमे जिबरेलिक एसिड ०.००१ सक्रिय सघटक के रूप मे समाहित है। पौध उत्पादन के साथ सहक्रियाशाल तत्व के रूप मे कार्य करता है तथा पौध के संवर्धन प्रदान करता है। साथ ही यह अन्तः स्त्राव व प्रक्रिषिक सक्रियता को उत्तेजित कर फसल की दैहिक कार्यकुशलता में वृद्धि कर उत्पादित फसल की किस्म व उपज को बढ़ाता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)		
अंगूर	प्रथम छिड़काव : काट-छाट के ३०-३५ दिन के बाद द्वितीय छिड़काव : पुष्प अवस्था में	०.०१८	१८०	४५०-५००	२
कपास	प्रथम छिड़काव : रोपण के ४०-४५ दिन बाद द्वितीय छिड़काव : खेड़ी बनने के समय	०.०१८	१८०	४५०-५००	२
केला	प्रथम छिड़काव : तीसरे महीने, द्वितीय छिड़काव : पाँचवें महीने तृतीय छिड़काव : फल आने या लगने के समय	०.०२७	२७०	४५०-५००	
गन्ना (रोपी फसल)	प्रथम छिड़काव : ४०-४५ दिन बाद द्वितीय छिड़काव : रोपण के ७५-८० दिन बाद	०.०१८	१८०	४५०-५००	२
धान	लघु कलरावधि किस्में-पंछ रोपण के २०-२५ दिन बाद मध्यम कलरावधि किस्में-पंछ रोपण के ३०-३५ दिन बाद दीर्घ कलरावधि किस्में-पंछ रोपण के ४०-४५ दिन बाद	०.०१८	१८०	४५०-५००	१
पत्ता रोभी / फूलगोभी	प्रथम छिड़काव-रोपण के ४५ दिन बाद द्वितीय छिड़काव-रोपण के ६५ दिन बाद	०.०१८	१८०	४५०-५००	२
प्याज	रोपण के २५-३० दिन बाद	०.०१८	१८०	४५०-५००	१
भिण्डी / बैंगन	प्रथम छिड़काव-प्रत्यारोपण के ३४ दिन बाद द्वितीय छिड़काव-प्रत्यारोपण के ७० दिन बाद	०.०४५	४५०	४५०-५००	३
मूंगफली	तृतीय छिड़काव-प्रत्यारोपण के १०५ दिन बाद कुलाई के ३०-३५ दिन बाद	०.०१८	१८०	४५०-५००	१
शहतूत	द्वितीय छिड़काव-तैयार फसल के १५-२० दिन बाद द्वितीय छिड़काव-प्रथम छिड़काव के २५-३० दिन बाद	०.०४५	४५०	४५०-५००	२

उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग में आने वाले यन्त्र :- जिबरेलिक एसिड ०.००१ प्रतिशत एल का खेल में अधिक मात्रा में छिड़काव के लिए बकेट फुहार, स्टायअर पम्प फुहार, पैदल चलने वाली फुहार, व्हील बारो फुहार, कम्प्रेसन नेपसेक फेहार, कम्प्रेसन नेपसेक बैटरी फुहार या एस्पी एच टी पी पावर हार किया जा सकता है। कम मात्रा के छिड़काव के लिए नेपसेक मिस्ट ब्लोअर व डस्टर उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं छिड़काव घोल की तैयारी- छिड़काव के लिए घोल तैयार करने हेतु जिबरेलिक एसिड ०.००१ प्रतिशत एल की वांछित मात्रा एक लीटर पानी में १ मीली की दर से मिलाये तथा उस घोल को प्रति एकड़ १८०-२०० लीटर की दर से और पानी में घोल लें। अनुकूलता- जिबरेलिक एसिड ०.००१ प्रतिशत एल मिश्रण को छोड़कर बाकि अन्य सभी सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों, कीटाणुनाशकों, शाकनाशियों व फफूंदनाशियों के अनुकूल है। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और फर्शों के चारों से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३) छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूधित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष के लक्षण :** सिर दर्द, भिँतली, उल्टी, आँखों और त्वचा में जलन हो सकती है। **प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुनगुने करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निगला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूधित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूधित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखें दूधित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगमग १०-१५ मिन्ट तक धोएं। ४) यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **विष नाशक :** कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** पैकजों को तोड़कर आबदी जमीन में गाड़ दें प्रयोग किये हुये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बहार न छोड़ें। डिब्बों या बची सम्पदा या धोवन का नीपटारा इस प्रकार करें कि आसपास की चीज़ें, पानी प्रदूषित न हों। **संसाधन की शर्तें :** इस सामग्री से युक्त पैकजों को पृथक कमरों या स्थानों पर अन्य कमरों या स्थानों, जिनका प्रयोग अन्य प्रकार की सामग्री रखने के लिए किया जाता हो, से दूर रखें। सामग्री कितनी मात्रा व किस प्रकार की है इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे सुरक्षित ताले में रखें। जिन कमरों या स्थानों पर इन्हें रखा जाना है वे सुनिर्मित, शुष्क, पर्याप्त रोशनीए हवादार तथा आकार के होने चाहिए।

रासायनिक संरचना :

जिबरेलिक एसिड ०.००१ प्रतिशत एल (शुद्धता पर आधारित १०० प्रतिशत)	०.०१ % भार/भार
प्रोटिन (जल अपघटित)	२.५ % भार/भार
समुद्री धासपात (मरीना ब्रैन अल्गी ऐक्स्ट्रैक्ट)	३ % भार/भार
Feso. 7H ₂ O (Min 95%)	२.३ % भार/भार
Mnso. 3H ₂ O (Min 90%)	१.४ % भार/भार
Znso. 7H ₂ O (Min. 95%)	३.९ % भार/भार
Mgso. 7H ₂ O (Min 90%)	४.३ % भार/भार
एमल्सिफायर	१ % भार/भार
टविन ८० (सारबिटल मोनो ओलियट) विलायक (पानी)	प्रयाप्त मात्रा % भार/भार
कुल	१०० % भार/भार

योग : १००.०० % भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

ಸಿಗ್ರೀನ ಸುಪರ

ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ ೦.೦೦೧% ಎಲ್
(ರೊಪ ವಾಡ್ ಉತ್ಪ್ರೇರಕ)

ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ ೦.೦೦೧% ಎಲ್.ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣಿ ಪೀಕ ವಿಕಾಸ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಹೇ. ಜ್ಯಾಮಧ್ಯೆ ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ ೦.೦೦೧ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಲ್ಯಾ ರಫಾನೆ ಸಮ್ಮಿಲಿತ ಆಹೇ. ಪೀಕ ಪಾಕ ಸಹಕೃಷಿಣೀಲ ತವ ಮ್ಹಣ್ನ್ ಹೇ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತೆ. ತಸೆಂ ಪೀಕ ವಾದಿಸ ಕಾರಣಿಗಿನ್ ಠರತೆ. ಸೊತಕ ಅಂತ.ಸ್ಕಾವ ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯಕ ಉತ್ತೇಜಿತ ಕರುಂ ಪೀಕಾಲ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಕ ಕಾರ್ಯ ಕುಶಲತೆತ ವಾಡ್ ಕರ್ತೆ. ಫ್ರಾಮ್ಲೆ ಉಪಾದನಾಚ ದರ್ಜಾ ವ ಉಪಜ ವಾದತೆ.

ಸಿಫಾರಸ :

ಪೀಕ	ಕಿಡಿಚೆ ನಾಂವ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್		ಪಾಪ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಲಿಟರ್)	ಅಂತಿಮ ಫವಾರಣಿ ತೆ ಕಾಡಣಿಗಿರ್ಪತಾ ವೆಡ್ (ದಿವಸಾಂತ)
		ಸ.ತವ (ಗ್ರೆಂ)	ಸಂರಚನಾ (ಮಿಲಿ)		
ದ್ರಾಖ	ಪಹಿಲಿ ಫವಾರಣಿ : ಟ್ರಾಟೀಚ್ಯಾ 30-35 ದಿವಸಾಂನಿ ದುಸರಿ ಫವಾರಣಿ : ಫುಲೇಲ್ಯಾ ಅವಸ್ಥೆತ	೦.೦೧೮	೧೮೦	೪೫೦-೫೦೦	೨
ಕಾಪುಸ	ಪಹಿಲಿ ಫವಾರಣಿ : ಲಾಗವಣಿಂತರ್ ೪೦-೪೫ ದಿವಸಾಂನಿ ದುಸರಿ ಫವಾರಣಿ : ಬೊಡ ಲಾಗವ್ಯಾವೇಡಿ	೦.೦೧೮	೧೮೦	೪೫೦-೫೦೦	೨
ಕೆಂಜಿ	ಪಹಿಲಿ ಫವಾರಣಿ : ತಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಹಿತ್ಯಾತ, ದುಸರಿ ಫವಾರಣಿ : ಪಾಚ್ಯಾ ಮಹಿತ್ಯಾತ ತಿಸ್ತಾಚಿ ಫವಾರಣಿ : ಫಡ ಲಾಗತಾನಾ	೦.೦೨೮	೨೮೦	೪೫೦-೫೦೦	೨
ಊಸ (ರೊಪ ಅವಸ್ಥಾ)	ಪಹಿಲಿ ಫವಾರಣಿ : ಫುಲವಣಿಂತರ್ ೪೦-೪೫ ದಿವಸಾಂನಿ ದುಸರಿ ಫವಾರಣಿ : ಫುಲವಣಿಂತರ್ ೮೫-೮೦ ದಿವಸಾಂನಿ	೦.೦೧೮	೧೮೦	೪೫೦-೫೦೦	೨
ಭಾತ	ಲಘು ಕಾಡಾಣಿಗಿಂನಿ ಲಾಗವಣಿಂತರ್ ೨೦-೨೫ ದಿವಸಾಂನಿ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಡಾಣಿಗಿಂನಿ ಲಾಗವಣಿಂತರ್ 30-35 ದಿವಸಾಂನಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಡಾಣಿಗಿಂನಿ ಲಾಗವಣಿಂತರ್ ೪೦-೪೫ ದಿವಸಾಂನಿ	೦.೦೧೮	೧೮೦	೪೫೦-೫೦೦	೧
ಪರ್ಯಾವೇಡಿ/ಫುಲಾವೇಡಿ	ಪಹಿಲಿ ಫವಾರಣಿ : ಲಾಗವಣಿಂತರ್ ೪೫ ದಿವಸಾಂನಿ ದುಸರಿ ಫವಾರಣಿ : ಲಾಗವಣಿಂತರ್ ೬೫ ದಿವಸಾಂನಿ	೦.೦೧೮	೧೮೦	೪೫೦-೫೦೦	೨
ಕಾಂಡ	ಲಾಗವಣಿಂತರ್ ೨೫-30 ದಿವಸಾಂನಿ	೦.೦೧೮	೧೮೦	೪೫೦-೫೦೦	೧
ಗೊಡೆ/ವಾಣಿ	ಪಹಿಲಿ ಫವಾರಣಿ : ಲಾಗವಣಿಂತರ್ 3೫ ದಿವಸಾಂನಿ, ದುಸರಿ ಫವಾರಣಿ : ಲಾಗವಣಿಂತರ್ ೫೦ ದಿವಸಾಂನಿ, ತಿಸ್ತಾಚಿ ಫವಾರಣಿ : ಲಾಗವಣಿಂತರ್ ೧೦೫ ದಿವಸಾಂನಿ	೦.೦೪೫	೪೫೦	೪೫೦-೫೦೦	3
ಭುಡ್ಲೆಮ್ಲಾ	ಪಹಿಲಿ ಫವಾರಣಿ : ಪೇಣಿಚ್ಯಾ 30-35 ದಿವಸಾಂನಿ ದುಸರಿ ಫವಾರಣಿ : ಫುಲಾವೇಡಿ ಅವಸ್ಥೆತ	೦.೦೧೮	೧೮೦	೪೫೦-೫೦೦	೧
ಫುಲ	ಪಹಿಲಿ ಫವಾರಣಿ : ಪೀಕ ತಯಾರ್ ಅವಸ್ಥೆಚ್ಯಾ ೧೫-೨೦ ದಿವಸಾಂನಿ ದುಸರಿ ಫವಾರಣಿ : ಪಹಿಲ್ಯಾ ಫವಾರಣಿಚ್ಯಾ ೨೫-30 ದಿವಸಾಂನಿ	೦.೦೪೫	೪೫೦	೪೫೦-೫೦೦	೨

ವಾಪರಾಸಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶನ : ೧) ಉಪಯೋಗತ ಆಗಲೆ ಜಾಗಣೆ ಫವಾರಣಿ ಪಂಪ : ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ ೦.೦೦೧ ಟಂಕೆ ಎಲ್.ಶಾ.ಶೆತೀಂಚೆ ಫವಾರಣಿ ಸಾಡಿ ಬಕೆಂಟ್ ಪಂಪ, ಸ್ಟಾಪ್‌ಆಪ್ ಪಂಪ, ಕುಂಟ್ ಪಂಪ, ನೆಪೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಜರ್, ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ನೆಪೆಂಟ್ ಬೆಂಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಜರ್ ಕಿವಾ ಆಂಸ್ಕಿ ಎಂ.ಟಿ.ಪಿ. ಪೆಂವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಜರ್‌ಚಾ ವಾಪರ ಕೆಲಾ ಜಾಕು ಶಕ್ತಾಂ, ಕಮಿ ಮಾನ್ಡೆಚ್ಯಾ ಫವಾರಣಿಗಿಂನಿ ನೆಪೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಬೊಚರ್ ವ ಟಂಕರ್ ಚಾ ವಾಪರ ಕೆಲಾ ಜಾಕು ಶಕ್ತಾಂ. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರ್ ಕರ್ಪಣಾಚಿ ಪದ್ಧತಿ : ಫವಾರಣಿಚೆ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರ್ ಕರ್ಪಣಾಚಾ ಹೆಲ್ ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ ೦.೦೦೧ ಟಂಕೆ ಎಲ್ ತೆ ಆವಶ್ಯಕ ಮಾತ್ರಾ ೧ ಲಿಟರ್ ಪಾಪ್ಯಾತ ೧ ಮಿಲಿ ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾತ ಮಿಸ್‌ಜುಂಟ್ ಏಕರಿ ೧೮೦-೨೦೦ ಲಿಟರ್‌ಚ್ಯಾ ಆಗಿಂ ಪಾಪ್ಯಾತ ಮಿಸ್‌ಜುಂಟ್ ಫವಾರಣಿ. ಮಿಶ್ರಣ ಕಮತಾ : ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ ೦.೦೦೧ ಟಂಕೆ ಎಲ್ ಹೆ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣಣೆ ವಾಪರಲ್ಯಾ ಜಾಗಣ್ಯಾ ಖತ, ಕೊಡವಣಾಕ, ಬುಣಿಣಾಕ, ತಣ್ಣಣಾಕಾಂನಿ ವಾಪರಾ ಯೆತೆ. **ವಾಪರತಾನಾ ಧ್ಯಾವಯಾಚಿ ದಕ್ಷತಾ :** ೧) ಅನುಪಧ್ಯಾ, ಅನುಪಧ್ಯಾಚಿ ರಿಕಾಮೆ ಡಬ್, ಆಗಿಂ ಜನಾವಣಾಚ್ಯಾ ವಾಪರಾಪಸ್ ದೂರ ತಾಂ. ೨) ಲೊಡ್, ಡೋಮ್‌ಗಿಂನಿ ಸರ್ಕು ಹೊಡ್ ಜುಂಕಾ. ೩) ಫವಾರಣಿಚೆ ಉಪಾರ್ಥ ವಾಸಾಡ್ಪೆ ಆತಾಂ ಚುಂಕಾ, ವಾಪಾಚ್ಯಾ ದಿಶೆಂನಿ ಫವಾರಣಿ ಕರಾ. ೪) ಫವಾರಣಿಂತರ್ ದುಶಿತ ಖಾಲೊ ಕಪಡೆ ಆಗಿಂ ಶರೀರಾಚಾ ಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಥುಂಕಾ. ೫) ಫವಾರಣಿ ಕರತಾನಾ ಖುಪ್ರಾಂ, ಖಾಕು-ಪಿಕ್‌ಅಥವಾ ವಚ್ಚುಂ ನುಂ. ೬) ಫವಾರಣಿ ದ್ರಾವಣ ಬನವಿತಾನಾ ಸಂಪುರ್ಣ ಸುಶಿಖಿತ ಕಪಡೆ ವಾಪರಾಂ. **ವಿಶವಾಂವಿ ಲಕ್ಷಣ :** ಡೋಮ್‌ಚಿ, ಮೂಡ್, ಡೋಮ್ ವರ್ತುಣಿ ಆಗ್ ಹೊಡ್ ಶಕ್ತಾಂ. **ಪ್ರಥಮೋಪಾರ್ಥ :** ೧) ಜರಗಿಡಲೆ ಗೇಲೆ ಅಸಲೆ ತರ, ಧರ್ಶಾಂ ಬೊಡ್ ಧಾಲ್ತುಂ ಉಲಟಿ ಕರ್ತಾಚಿ ಹೊಡ್ ಕ್ರಿಯಾ ಪುನ್. ಪುನ್: ಕರೀತ ರಹಾಚಿ ಜೊರ್ಪೆಂಟ್ ಉಲಟಿ ಸಾಂಕ್ ಹೊಡ್ ನಾಚಿ. ಜರಗಣೆ ಬೇಗ್‌ಚ್ಚೆ ಅಸಲೆ ತರ ಉಲಟಿ ಕರ್ತುಂ ನುಂ. ೨) ಜರಗಣೆ ವರ್ತುಣಿ ವರ್ತುಣಿ ದುಶಿತ ಖಾಲೊ ಕಪಡೆ ಕಾಡಾಂ ವರ್ತುಣಿ ಭರ್ಪುರ್ ಸಾಬಣ್ ವ ಪಾಪ್ಯಾಂನಿ ಸುಂ. ೩) ಜರಗಿಡಲೆ ಗೇಲೆ ತರ ಭರ್ಪುರ್ ಪ್ರಮಾಣಾತ ಸಲಾಂಟ್/ಸ್ವಚ್ಛ ಪಾಪ್ಯಾಂನಿ ಜವಜ್ ಜವಜ್ ೫ ಮಿನಿಟೆ ಥುಂಕಾ. ೪) ಜರಗಣೆ ವಾಸಾಡ್ಪೆ ಆತಾಂ ಗೇಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಬಣ್ ಮೊಡ್‌ಚಾಂ ಹವೆತ ಆಗಾಂ. **ಉತ್ತರಾ :** ಕೊಣೆಲೆಗಿಂನಿ ವಿಶಿಶ್ಟ ವಿಷಣಾಕ ನಾಚಿ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ್ ಉಪಾರ್ ಕರಾ. **ವಾಪರಲ್ಯಾ ಡಬ್‌ಯಾಂನಿ ವಿಲೇವಾರ್ :** ರಿಕಾಮೆ ಪೆಂಕೆಜಿಸ್ ಮೊಡ್-ತೊಡ್ನ್ ವಸ್ತೀಪಾಸ್ ದೂರ ಜಾಗೆಂನಿ ಖೊಲಿ ಪುರ್ತಾಚಿ. ಪುನ್ ವಾಪರಲಿ ಜಾಕುಂ ನುಂ ಮ್ಹಣ್ನ್ ರಿಕಾಮೆ ಪೆಂಕೆಜಿಸ್ ಉಪಾರ್ಥಾಚ್ ಟಾಕುಂ ನುಂ. ಪೆಂಕೆಜಿಸ್ ಕಿವಾ ಉಲೆಲೆ ದ್ರಾವಣ ಕಿವಾ ಫವಾರಣಿ ಥುಲಲೆಲೆ ಪಾಣಿ ಯಾಂನಿ ವಿಲೇವಾರ್ ಪರ್ಯಾಂನಿ ಕಿವಾ ಪಾಣಿ ಪ್ರಶುಖಿತ . ಹೊಣ್ ನಾಚಿ ಅಶಾ ಸುಶಿಖಿತ ಪದ್ಧತೀಂನಿ ಲಾಬಾಚಿ. ಸಾಡಣಿಚ್ಯಾ ಆದಿ : ಹೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನುಗುಣಿ ಪೆಂಕೆಜಿಸ್ ಇತರ ಮಾ ಡೆವಂಪ್‌ಸಾಡಿ ಅಸಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗಾಂ ವ ಖೋಲ್ಯಾ ಯಾಂಪಸ್ ವಿಶೇಶ್. ಅನುಪಧ್ಯಾ ಡೆವಂಪ್‌ಸಾಡಿ ಅಸಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗೆಂನಿ ವ ಖೋಲ್ಯಾ ಯಾಂಪಸ್ ದೂರ ಜಾಗೆಂನಿ ವ ಖೋಲ್ಯಾ ಕಿವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ದರ್ಜಾಂನಿ ವ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂ ಕಪಾಡ್ ಕಡೆಚಿ ಕುಲಾಪ್ ಡೆವಾಂನಿ. ಹೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಕಾಂನಿ ಡೆವಂಪ್‌ಸಾಡಿ ಜಾಗಾಂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧಿಂನಿ ಕೊಡೆಚಿ, ಹಾಂ ಖೊಡೆಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭರ್ಪುರ್ ಉಪಾರ್ಥಾಚಿ ವ ಪುಣಿ ಮೊಡಿ ಅಸಾಚಿ.

ಸಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನಾ :

ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ (ಕಿಮಾನಾ ಶುದ್ಧತಾ 90% ವ/ವ ಸ.ತ.)	೦.೦೧೧ ವ/ವ
ಪ್ರೊಟಿನ್ (ಹಾಂಪ್‌ಲಾಂಚ್)	೨.೫ ವ/ವ
ಸಂಪುರ್ಣ ವಸ್ತುತೆ (ಮೀನಾ ಬ್ರಾಡುನ್ ಅಲಗಾಂಟ್ ಫಕ್ಟರ್‌ವೆಂಟ್)	೩ ವ/ವ
FeSO ₄ ·7H ₂ O (Min 95%)	೨.೩ ವ/ವ
MnSO ₄ ·3H ₂ O (Min 90%)	೧.೪ ವ/ವ
ZnSO ₄ ·7H ₂ O (Min. 95%)	೩.೧ ವ/ವ
MgSO ₄ ·7H ₂ O (Min 90%)	೪.೩ ವ/ವ
ಫಾಸ್ಫೊರಸ್	೧ ವ/ವ
ಟರ್ಬಿಲೈಸರ್ (ಸಾರ್ಬಿಲೈಸರ್ ಮೊನೊ ಆಲಿಯಾಟ್) ವಿಲಾಂಪ್ (ಪಾನಿ)	ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರಾ ವ/ವ
ಕುಲ	೧೦೦ ವ/ವ

ಯೋಗ : ೧೦೦.೦೦ ವ/ವ

ನಿರ್ಮಾತಾ : ಎಲ್‌ಟಾ ಆಗ್ರೊ ಪ್ರಾ. ಲಿ.,

ಜಿ-೬/೮, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೆಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಜವಜ್, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ್,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ್, ಸಾಂಗಲಿ-೪೧೬ ೪೧೫, (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ. : +೯೧ ೨೩೩ ೨೬೪ ೦೪೩.

ಉತ್ಪಾದನ ಪರಿಸರ : ಸಡ್ಲೆ ನಂ. ೧೯/೧೮, ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ. ೧, ಕುಪವಾಡ - ೪೧೬ ೪೩೬, ತಾ. ಮಿರಜ, ಜಿ. ಸಾಂಗಲಿ, (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಭಾರತ.

ಯಾ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಿವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇತರ ಪೀಕಾರ್ ವಾಪರ ನಾಚಿ.

ಸಿಗ್ರೀನ ಸುಪರ

ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ ೦.೦೦೧% ಎಲ್
(ಸಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ)

ಡಬ್ಲಿಯು.ಎಸ್. ಡಿ.ಎಸ್. ಮುನ್ಸಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಗಜಾನನ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಸಾಂಗಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ.

ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ 0.001% ಎಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಸಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ 0.001% ಎಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಖಾಣಿಕಾತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಟೆನ್ಸಿವ್‌ಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಬೆಳೆಗಳು ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. **ಉಪಯೋಗಗಳು:**

ಬೆಳೆ	ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೇಳೆ	ಪ್ರಮಾಣ/ಬೆಳೆಗಲೆಗೆ		ಕರಗಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ(ಲೀ)	ಕೊನೆಯ ಸಂಪರ್ಕಿತತೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಫ. (ಗ್ರಾಂ)	ಪ್ರಮಾಣ/ಬೆಳೆಗಲೆಗೆ (ಮಿ.ಲೀ.)		
ದ್ರಾಖೆ	1st ಸಂಪರ್ಕಿತ: 30-35 ದಿವಸದ ನಂತರ 2nd ಹೊಡೆತದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1st ಸಂಪರ್ಕಿತ: 40-45 DAP 2nd ಕಾಯ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ	0.018	180	450-500	2
ಬಾಳೆಕಾಯ	1st 3 ನೇ ತಿಂಗಳು 2nd 5 ನೇ ತಿಂಗಳು 3rd ಕಾಯ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ	0.027	270	450-500	2
ಕಬ್ಬು	1st 40-45 DAP 2nd 75-80 DAP	0.018	180	450-500	2
ಭತ್ತ	ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ 20-25 DAP ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ 30-35 DAP ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ 40-45 DAP	0.018	180	450-500	1
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್/ಮೋಟಾರ್	1st 45 DAS 2nd 65 DAS ಸಾಟಿಯಾದ 25-30 ದಿವಸದ ನಂತರ	0.018	180	450-500	2
ಕಾಯಿ	1st - 34 DAP 2nd - 70 DAP 3rd - 105 DAP	0.045	450	450-500	1
ತೆಂಗು	1st - 30-35 DAP 2nd - ಹೊಡೆತದ ಹಂತದಲ್ಲಿ	0.018	180	450-500	1
ಒಮ್ಮೆನೇರಳೆ	1st ಸ್ಪ್ರೇ -15-20 DAP 2nd - ಹೊಡೆತದ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಆದ 25-30 ದಿವಸದ ನಂತರ	0.045	450	450-500	2

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕಿತಗಳು: ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ 0.001% ಎಲ್ ನ್ನು ಹೈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಪಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಬಳಸಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಅಥವಾ ASPEE HTP ಪಾಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. **ಸಂಪರ್ಕಿತ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಕೆ:** 1ml ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ 0.001% ಎಲ್ ನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಎಕರೆಗೆ 180-200 ಲೀಟರ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಮೋಡರ್ನಿಟಿ : ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಸಾಯನಿಕಗಳಿಗಿಂತ, ಕೆಲವು, ಹರ್ವೆಸ್ಟ್, ಹಾಗೂ ಬೇರೊಂಥನಾಕಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೋರ್ಡ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವೇಳೆ : 1ml ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ 0.001% ಎಲ್ ನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಗಲುವಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮುಂಚಿನ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿತ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಂಪರ್ಕಿತ 6 ಘಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕಿತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ. ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಾಟಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಅಳಿಸಿ, ಬಳಸಿ.

ಮುಂಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು: 1 ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಅಪಾರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ದೂರವಿಡಿ. 2ನೆಯ ಕಣ್ಣು, ಹರ್ವೆಸ್ಟ್ ತಗಲುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. 3 ಸಂಪರ್ಕಿತ ದ್ರಾವಣದ ವಾಸನೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೆರ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 4 ಸಂಪರ್ಕಿತದ ನಂತರ ಸೋರಿಕೆ ತಗಲಿದರೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗ ಬರಿದು ಸೇರುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಉಪಯೋಗದ ಉಪದೇಶಗಳು : ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತುವುದು, ಮೂಗು ಗಂಟು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕವಲದ ಕೆರತ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೂಗು ಬಿಡುವುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1 ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರತ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2 ಕೆಲವುಕೊಂಡ ಅಲ್ಪಕಾಲ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣ, ಲಕ್ಷಣದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ.

ಪಾಲಿ ಡಿಸ್ಪೆರ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ : ಬರಿವಾದ ಡಿಸ್ಪೆರ್ಸರ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆನ್ನುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಪಾಲಿ ಡಿಸ್ಪೆರ್ಸರ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನ ಪರಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುನ್ನ ಜಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಕೇವಲ : ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಾಡಲು ಸಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೂಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗಳ ತಂಪಾದ, ಮಧ್ಯ ಹವೆ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ತಿನ್ನುವವರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೋಣೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೇವಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮೂಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವಂತಹುದೇ.

ಸಾಂಪರ್ಕಿತ ಸಂಯೋಜನೆ:

1 ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ (100% w/w ಮಧ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಸ.ಫ. 0.001% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ	2.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
2 ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಹೆರ್ಮೋಲೈನ್	3.0% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
3 ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. ೧, ಕುಪವಾಡ -416436	2.3% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
4 FeSO ₄ ·7H ₂ O (min 95%)	1.4% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
5 MnSO ₄ ·3H ₂ O (min 90%)	3.9% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
6 ZnSO ₄ ·7H ₂ O (min 95%)	4.3% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
7 MgSO ₄ ·7H ₂ O (min 90%)	1.0% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
8 ಎಮುಲೆಸರ್‌ಯರ್ ಟೈನ್ 80 (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೋಟಾರ್‌ಯಿಂಟ್)	ಕೆ.ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
9 ಸಾಲವೆಂಟ್ (ನೀರು)	100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಉಪಯೋಗ : ಎಲಂಟಾ ಆಗ್ರೊ ಪ್ರಾ. ಲಿ.,

ಜಿ-೬/೮, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೆಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಜವಜ್, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ್,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ್, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕ್ಯಾಪ್ಟಿಂ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. ೧, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಬಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ: ೧೨332644043

ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



An ISO 9001:2015 certified company

ಸಿಗ್ರೀನ ಸುಪರ

ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ 0.001% ಎಲ್

(ಸಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ)

ಸಿಗ್ರೀನ ಸುಪರ

ಜಿಬ್ರೆಲಿಕ ಅಸಿಡ್ ೦.೦೦೧% ಎಲ್

(ರೊಪ ವಾಡ್ ಉತ್ಪ್ರೇರಕ)

ಉಪಯೋಗ : ಎಲಂಟಾ ಆಗ್ರೊ ಪ್ರಾ. ಲಿ.,

ಜಿ-೬/೮, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ್ ಹೌಸಿಂಗ್

ಸೊಸೈಟಿ, ರೆಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಜವಜ್, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ್,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ್, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕ್ಯಾಪ್ಟಿಂ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. ೧, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಬಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ: ೧೨332644043

ನಿರ್ಮಾತಾ : ಎಲ್‌ಟಾ ಆಗ್ರೊ ಪ್ರಾ. ಲಿ.,

ಜಿ-೬/೮, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೆಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಜವಜ್, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ್,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ್, ಸಾಂಗಲಿ-೪೧೬ ೪೧೫, (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ. : +೯೧ ೨೩೩ ೨೬೪ ೦೪೩.

ಉತ್ಪಾದನ ಪರಿಸರ :

ಸಡ್ಲೆ ನಂ. ೧೯/೧೮, ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ. ೧, ಕುಪವಾಡ - ೪೧೬ ೪೩೬,

ತಾ. ಮಿರಜ, ಜಿ. ಸಾಂಗಲಿ, (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಭಾರತ.

