

Recommendations : It is recommended to control scab of apple, blast and sheath blight of rice, tikka of groundnut, powdery mildew of mango, rust of soyabean, blister blight of tea and powdery mildew of grapes. Caution : Do not spray if there is a possibility of harming bees and fish, live stock, game, wild birds and animals.

Precautions : 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with eyes, mouth and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.

First aid : 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient unconscious. 2) If clothing and skin is contaminated, remove the clothing and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms :** Nervousness, anxiety, tremor, diarrhoea and allergic manifestations may occur.

उपयोग : इस फफूंदनाशक का प्रयोग सेब के पामा, धान का सहसामारी, अंगमारी, मूँगाफली को टिक्रा, आम का चूर्ण अस्तिता, सोयाबीन का गेरुआ, चाय का फफोला अंगमारी और अंगूर का चूर्ण अस्तिता रोग के रोकथाम हेतु किया जाता है। सावधान : जहाँ मधुमखी, मछली, पालतू जानवर, खेल के मैदान, जानवरों और चिड़ियों के नुकसान की संभावना हो छिड़काव न करें। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग करने से पहले संलग्न लिफलेट पढ़ें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १) खादसामग्री, खाद सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचाये। ३) छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों के अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के बाद धुन्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें।

प्राथमिक चिकित्सा : १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखों दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण :** घबराहट, परेशानी, कंपकपी, और अलर्जी हो सकती है।

Please read enclosed leaflet carefully before use.

Caution : Not to be used on crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

CIR-174899/2020-Hexaconazole (EC) (423) - 1545



Hexaconazole 5% EC
Systemic Fungicide

हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत ई.सी.
अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

ELANTA[®]
HEXA CON

एलंटा हेक्साकोन

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.



Keep out of
reach of
children

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें



An ISO 9001:2015
certified company



Chemical Composition:

Chemical Composition:		रासायनिक संरचना :	
Hexaconazole Tech	5.50 % W/W	हेक्साकोनाजोल टैक्निकल	५.५० % भार/भार
(Based on 92% W/W a.i.)		(भारानुसार ९२ प्रतिशत स.त. पर आधारित)	
Emulsifier a) Styrenated phenol	5.00 % W/W	इमल्सिफायर अ) स्टाइरिनेटेड	५.०० % भार/भार
ethylene oxide		फिनाइल इथिलीन	
condensate		ऑक्साइड कन्डेंसेट	
b) Dodecyl benzene	5.00 % W/W	ब) डोडेसिल बेंजीन	५.०० % भार/भार
sulfonic acid Ca salt		सल्फोनिक एसिड कैल्शियम साल्ट	
Solvent (Aromax)	84.50 % W/W	घोलक (एरोमेक्स)	८४.५० % भार/भार
Total : 100.00 % W/W		योग : १००.०० % भार/भार	

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-174899/2020-Hexaconazole (EC) (423) - 1545

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : LCIM0320220025

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Mfd. & Mkted by :


ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagroangli@gmail.com **Cust. care no.:** (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.

Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





An ISO 9001:2015 certified company

ELANTA HEXAACON

Hexaconazole 5% EC
(Systemic Fungicide)

एलंटा हेक्साकोन

हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत ई. सी.
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-174899/2020-Hexaconazole (EC) (423)-1545

ELANTA HEXACON

Hexaconazole 5% EC
(Systemic Fungicide)

It is a systemic fungicide containing Hexaconazole 5% active ingredient and balance adjuvants. It is used for control for scab of apple, blast and sheath blight of rice, tikka of groundnut, powdery mildew of mango, rust of soyabean, blister blight of tea and powdery mildew of grapes only.
Caution :- Do not spray if there is a possibility of harming bees and fish, live stock, game, wild birds and animals.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days	Re- entry after each Application (In Hours)
		AI (%/gm)	Formulation (%/ml)			
Grapes	Powdery mildew	25-50	500-1000	500	14	
Mango	Powdery Mildew	0.005% (5g/100L)	0.1% (100ml/100lit)	As required	30	
Tea	Blister blight	10	200ml	70-90 with power sprayer/ 175-200 with knapsack sprayer	7	
Rice	Blast, Sheath blight	50	1000	500	40	
Groundnut	Tikka Leaf Spot	75	1500	500	30	
Apple	Scab	0.0025%	0.05% (50ml/100lit)	As required	30	
Soybean	Rust	0.005% (5g/100L)	0.1% (100ml/100lit)	As required	30	

Direction of use : Plant protection equipment:-Take the required quantity of Hexaconazole 5% EC dilute with a little water and stir well using a stick. Then add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again stirring. Use knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack battery sprayer or ASPEE-HTP sprayer.

Precaution : 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 2) Avoid inhalation of the spary mist. Spray in the direction of wind. 3) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 4) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 5) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Nervousness, anxiety, tremor, diarrhoea and allergic manifestation may occur.

First aid : 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.
COMPATABILITY: Hexaconazole 5% EC is compatible with most of the commonly used insecticides and fungicides.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1) The packages shall be broken and buried away from habitation. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages or surplus material and washings from the machine and containers should be disposed in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Storage conditions : 1) The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2) The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, air, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical composition:

Hexaconazole tech (Based on 92% W/W a.i.)	5.50 % W/W
Emulsifier a) Styrenated phenol ethylene oxide condensate	5.00 % W/W
b) Dodecyl benzene sulfonic acid Ca salt	5.00 % W/W
Solvent (Aromax)	84.50 % W/W
Total: 100.00% W/W	

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-174899/2020-Hexaconazole (EC) (423)-1545

एलंटा हेक्साकोन

हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत ई. सी.
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

यह एक अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक है जिसमें हेक्साकोनाजोल सक्रिय तत्व ५ प्रति वजन के हिसाब से तथा बाकी अन्य सहायोी पदार्थ हैं। इसका प्रयोग सेब के पामा, धान का सहसामारी, अंगमारी, मूँगफली को टिका, आम का चूर्ण असिता, सोयाबीन का गेरुआ, चाय का फफोला अंगमारी और अंगूर का चूर्ण असिता रोग के रोकधाम हेतु किया जाता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल कटन के बीच अंतराल (दिन मं)	पूर: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (प्रतिशत/ग्राम)	संरचना (प्रतिशत/मिली)			
अंगूर	चूर्ण असिता रोग	२५-५०	५००-१०००	५००		१४
आम	चूर्ण असिता रोग	०.००५% (५ ग्राम/१०० लीटर)	०.१ (१०० मिली/१०० ली.)	आवश्यकतानुसार		३०
चाय	फफोला अंगमारी	१०	२०० मिली.	७०-९० शक्तिचालित/१७५-२०० पीट पर लाधने वाले छिड़काव		७
धान	सहसामारी पर्णच्छद अंगमारी रोग	५०	१०००	५००		४०
मूँगफली	टिका पर्ण चर्चित	७५	१५००	५००		३०
सेब	पामा	०.००२५%	०.०५% (५० मिली/१००ली)	आवश्यकतानुसार		३०
सोयाबीन	गेरुआ	०.००५% (५ ग्राम/१०० लीटर)	०.१% (१००मिली/१००ली.)	आवश्यकतानुसार		३०

उपयोग के लिए निर्देश : इसकी निर्धारित मात्रा को पहले थोड़े पानी में अच्छी प्रकार मिलाएं उसके बाद पानी कि आवश्यक मात्रा जो मात्रा निर्धारित की गयी हो मिलाएं और डंडे से अच्छी प्रकार मिलाएं।

पौध सुखा यंत्र : इसका छिड़काव सरलता से उपलब्ध छिड़काव यंत्र जैसे पीठ पर लटकने वाला पॉवचलित या दबावदार पीठ पर लटकने वाला छिड़काव यंत्र दबावदार शक्ति चलित छिड़काव यंत्र या ए.एस.पी.ई.ई. -एच.टी.पी. छिड़काव यंत्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) त्वचा, मुँह और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३) छिड़काव के बाध्य को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूधित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धुप्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र, दस्ताने, जूते पहनना चाहिए।

विष के लक्षण : घबराहट, पेशेनामी, कपकपी, दस्त और एलर्जिक हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। २) यदि कपड़े और त्वचा दूधित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखों दूधित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सलाईन/ साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

सुरक्षा विषाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह फफूंदनाशक कर्षोधविशक्त नहीं है।

अनुरूपता : हेक्साकोनोजोल ५ प्रतिशत ई.सी. अमतौर पर प्रयोग में आने वाले सभी फफूंदीनाशक और कीटकनाशक के साथ मिलाया जा सकता है। **विषनाशक :** कोई विशेष विष नाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १) फफूंदीनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) खाली डिब्बों को बाहर न छोड़िए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। ३) खाली डिब्बों या बची सामग्री का धोवन का नीपटारा इस प्रकार करें की आसपास की चीजें, पानी प्रदूषित न हो।

संरक्षण की शर्तें : १) फफूंदीनाशक से घरे डिब्बों को अलग कमरो या जगहों में रखें तथा उन कमरो या जगहों से दूर रखें, जिन में अन्य वस्तुए रखी जाती हैं या अलग अलमारियों में ताला चाबी लगाकर फफूंदीनाशक की मात्रा व गुण के हिसाब से रखें। २) जिस कमरे या अलमारी में फफूंदीनाशक का भंडारण करण हो वह अच्छी तरह सूखा, निर्मित, पर्याप्त रोशनी व हवादार तथा पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि कोई प्रदूषण न हो। बबो की पहुच से दूर रखें।

रासायनिक संरचना :

हेक्साकोनाजोल टैक्निकल (भारतनुसार ९२ प्रतिशत स.त. पर आधारित)	५.५० % भार/भार
इमल्लिसफायर अ) स्टायरिनेटेड फिनाइल इथिलीन आक्साइड कर्बोसेट	५.०० % भार/भार
ब) डोडेसिल बेजीन सल्फोनिक एसिड कैल्शियम साल्ट	५.०० % भार/भार
घोलक (एरोमेक्स)	८४.५० % भार/भार

योग : १००.०० % भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।

एलंटा हेक्साकोन**हेक्साकोनाजोल ५% ई. सी.
(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)**

हे आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे. यामध्ये हेक्साकोनाजोल सक्रिय तत्व ५ प्रति किलो च्या प्रमाणात आहे, तसेच अन्य पदार्थांचा समावेश आहे. यांचा उपयोग सफरचंदवारील खवल्या रोग, तांदळावरील करपा रोग, शेंगाद्राण्यांच्या पानांवरील डाग, आंब्यावरील भुरी, सोयाबीन वरील तांबेरा, चहाच्या पानांवरील करपा आणि द्राक्षांवरील भुरीच्या रोगनियंत्रणासाठी केला जातो. **खबरदारी:** मधमाशी पालन, मत्स्यपालन, पाळीव प्राणी, मोकळ्या ठिकाणी फवारणी करू नये.

शिफारस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काळीजपर्यंत वेळ (दिवसांत)	कुहा फवारणीचा काळावरील प्रत्येक फवारणी नंतर (तास)
		स. तत्व (% / ग्रॅम)	संरचना (% / मि.ली.)			
द्राक्ष	भुरी	२५-५०	५००-१०००	५००	१४	
आंबा	भुरी	०.००५% (५ ग्रॅम / १०० लीटर)	०.१ (१०० मिली / १०० ली.)	आवश्यकतेनुसार	३०	
चहा	करपा	१०	२०० मिली.	७०-९० विजेवरील / १७५-२०० पाटीवरील फवारणी यंत्र	७	
तांदूळ	करपा, पर्णकोष करपा	५०	१०००	५००	४०	
भुईमूग	पानांवरील डाग	७५	१५००	५००	३०	
सफरचंद	पानांवरील डाग	०.००२५%	०.०५% (५० मिली / १०० ली.)	आवश्यकतेनुसार	३०	
सोयाबीन	तांबेरा	०.००५% (५ ग्रॅम / १०० लीटर)	०.१% (१०० मिली / १०० ली.)	आवश्यकतेनुसार	३०	

वापराचे निर्देशन : आवश्यक प्रमाणात हेक्साकोनाजोल ५% ई. सी. थोड्याशा पाण्यामध्ये मिसळा व लाकडी काठीने व्यवस्थित ढवळा. **वनस्पती सुरक्षा यंत्र :** नॅप्सेक स्प्रेअर, फुट स्प्रेअर, कम्पेन नॅप्सेक स्प्रेअर, पॉवर नॅप्सेक स्प्रेअर, बॅटरी स्प्रेअर, एएसपीईई-एचटीपी स्प्रेअर यांचा वापर करा. **वापर करताना ध्यावयाची दक्षता :** १) स्वयंपाकाची भांडी, अन्नपदार्थ तसेच जनावरांच्या चाण्यापासून लांब ठेवा. २) तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. ३) द्रावणाच्या फवारणीचे तुषार श्वसनाद्वारे आत घेऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणीनंतर किटकनाशकांच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) फवारणी करताना धुप्रपान, खाणे, पिणे अथवा चघळू नये. ६) फवारणीचे द्रावण बनविताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे वापरावेत. **विषबाधेची लक्षणे :** चिंतब्रस्तपणा, भिती वाटणे, अंग थरथरणे, अतिसार ही लक्षणे असू शकतात. **प्रथमोपचार :** १) जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असले तर घशात बोट घालून उलटी करावी. हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. २) कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन / पाण्याची हल्की धारेने १०-१५ मिनिटे धुवा. ४) जर श्वासनाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा. **पौष्टविषाक्तता :** शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन वनस्पती करीता विषारी नाही. **अनुकूलता :** हेक्साकोनाजोल ५% ई.सी. उपयोग बुरशीनाशक च्या मिश्रणामधून वापरला जातो. **विषनाशक :** कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. **रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट :** १) रिकामे पॅकेटस, डबे मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत. २) रिकामे डबे पुनर्वापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिकामे डबे, राहिलेले साहित्य तसेच यंत्र धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी. जेणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये. **साठवणीच्या अटी :** १) विशेषतः अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागेपासून दूर जागी वा खोल्यात कडीकुलपात ठेवावीत. २) या खोलीमध्ये किंवा कपाटामध्ये हे बुरशीनाशक साहित्य साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोटी असावी, त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदुषण टाळेल.

रासायनिक संरचना :

हेक्साकोनाजोल टेंक्विनल (भारानुसार ९२% स.त. वर आधारित)	५.५० % व/व
इमलिसफायर अ) स्ट्राइनेटेड फिनाइल इथिलीन ऑक्साइड कॅडॅसेट	५.०० % व/व
ब) डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अॅसिड कॅल्शियम सॉल्ट	५.०० % व/व
घोलक (अरोमॅक्स)	८४.५० % व/व

एकूण: १००.०० % व/व**निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,**

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

ಎಲಂಟಾ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನ**ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% EC
(ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)**

ಇದೊಂದು ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% EC ಸ.ಫ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಡ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸ ಬೆಳೆಯ ಕಡ್ಡೆರೋಗ, ಭತ್ತದ ಬೆಂಕಿರೋಗ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕವಚದ ಮುಟ್ಟೆರೋಗ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲೆಕುಕ್ಕಿರೋಗ, ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯ ಬೂದುರೋಗ, ಸೋಯಾಬಿನಸಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಕ್ಕುರೋಗ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೆಳೆಯ ಬೂದುರೋಗ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಬೆಳೆಯ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೈಟ್‌ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಜೇನುನೋಣ, ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪದಿಸಬೇಡಿ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು :

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಗುಂಡಿಸುವಿಕೆ (ಲೀ.ಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣಿಯಿಂದ ಕಟಾವಿನ ದಿನಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ
		ಸ.ಫ್ (% gm)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (% ml)		
ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮಾವು	ಬೂದುರೋಗ ಬೂದುರೋಗ	25-50 0.005%	500-1000 0.1%	500 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಸಾರ	14 30
ಚಹಾ	ಬೊಕ್ಕಿ ಅಂಗಮಾರಿ	10	200 ಮಿ.ಲೀ	70-90 ಮಿಲೀ ಹಾರ್ವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ 175-200 ಮಿಲೀ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ	7
ಭತ್ತ	ಬೆಂಕಿರೋಗ	50	1000	500	40
ನೆಲಗಡಲೆ	ಎಲೆಕುಕ್ಕಿರೋಗ (ಟೆಕ್ಟಾ)	75	1500	500	30
ಸೇಬು	ಕಡ್ಡೆ (ಸ್ಟ್ಯಾಬ್)	0.0025%	0.05%	(50 ಮಿಲೀ/100 ಲೀ)	ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಸಾರ
ಸೋಯಾಬಿನ್	ತುಕ್ಕು ರೋಗ	0.005%	0.1%	(100 ಮಿಲೀ/100 ಲೀ)	ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಸಾರ

ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಲಕರಣೆ : ಸ್ಟಾಪ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಮುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಪಿ ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% EC ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೇಕಾದ ದ್ರಾವಣದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಪಾತ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿರಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : ಅಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ವಾಯು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಸಿಂಪಡಣಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸಿಂಪಡಣಿಯಾದ ನಂತರ ಕಟಾವಿಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿತ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಡಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಸಿಂಪಡಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಾ, ಟೊಪ್ಪಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿರಿ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿರಿ.

ವಿಷ ತಗುಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಅತಂಕ, ನಡುಕ, ಬೇಧಿ, ಅಲರ್ಜಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಬಿಂದು ವೇಳೆ ವಿಷವೇರಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗಂಟಲಿನ ಒಳಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಿ. ಫೋನ್ ವಾಂತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮನವರಿಕೆಪಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಶ್ನಾಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಸೋಮ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಒಳಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವಂತೆ ವೈವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಣತೆ : ಶಿಫಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೌದಾರಣಿಕ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತ್ಯಾಘಾತ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಪಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಲೇವಾರಿ : ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಪಾಲಿಸ್ಪವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬಿಡಬೇಕು.

ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು : ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಇರುವ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಬಾರದು. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲೋದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೀಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕಲ್ (92.00% w/w ಸ.ಫ್ ಅಧಾರಿತ)	5.50% w/w
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ ಎ) ಸಿರಿನೇಟೆಡ್ ಟಿನ್‌ಲಾ ಎಥಿಲಿನ್ ಅಕ್ರೈಡ್ ಕಂಡೆನಸಿಟ್	5.00% w/w
ಬಿ) ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಬೆಂಜೆನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲವಣ	5.00% w/w
ದ್ರಾವಕ(ಪ್ರೋಪೈಲ್‌ಗ್ಲೈಕೊಲ್)	84.50% w/w
ಒಟ್ಟು	100.00 w/w

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



An ISO 9001:2015 certified company

ಎಲಂಟಾ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನ

ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% EC

(ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

एलंटा हेक्साकोन

हेक्साकोनाजोल ५% ई. सी.

(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ

ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

