

Recommendations : Extol E.C. (Emamectin Benzoate 1.9% E.C.) is a water soluble liquid formulation containing 1.9% active ingredient and is recommended for the control of bollworms in cotton; Leaf folder & hispa on paddy; green semilooper, pod borer, girdle beetle and tobacco caterpillar on soybean; pod borer on checkpea; fruit borer & thrips on chilli; fruit borer (helioverpa armigera) on tomato. It is an insecticide with stomach action and should be ingested by the larvae to be most effective. Affected larvae become paralyzed and stop feeding shortly after exposure to Extol E.C. (Emamectin Benzoate 1.9% E.C.) and subsequently die after 2-4 days.

Direction of use : Apply the insecticide when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary. Apply the insecticide in sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the foliage.

Precautions : 1) "Do not spray on crops on which honey bees are pollinators/foraging." 2) "Not to be used on crops other than specified on this label."

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.

First aid : Please read the enclosed leaflet.

Symptoms : Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular in-coordination, ataxia and muscle tremors.

उपयोग : एक्सटोल ई.सी. (ईमामेक्टिन बेन्जोएट १.९% ई. सी.) पानी में घुलने वाला तरल है, जिसमें १.९% सक्रिय तत्व है। यह कपास की डोडे की सुड़ियां; धान में पत्ता लपेटक और हिस्पा; सोयाबीन में हरा अर्थकुडलक, फल छेदक, गर्डल बीटल और तम्बाकू की सुड़ी; काबुली चना में फली छेदक; मिर्च में फल छेदक और शिप्स; टमाटर में फल छेदक (हेलिकोवरपा आर्मिजरा) की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। यह कीटनाशक पेट में जाने पर असर दिखाता है और अच्छे नियंत्रण के लिए इसे इल्लियों के द्वारा खाना आवश्यक है। ईमामेक्टिन बेन्जोएट से संपर्क होने पर, इल्लियां लखवगस्त हो जाती हैं और खाना बंद कर देती हैं तथा २-४ दिनों में मर जाती हैं।

उपयोग के लिए निर्देश : जब इल्लियों पहली बार दिखाई देती हैं, तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का छिड़काव करें। जरूरत लगे तो, पुनः छिड़काव करें। कीटनाशक को निर्दिष्ट मात्रा के पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १) "उन फसलों पर छिड़काव न करें जिन पर मधुमक्खियाँ परागण करती हैं या भोजन खोजती हैं। २) "इस लेबल पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य पर प्रयोग न करें।"

विषनाशक : कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

प्राथमिक चिकित्सा : कृपया संलग्न पत्रिका पढ़ें।

लक्षण : इस कीटनाशक से सम्पर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारंभिक लक्षण, पुतलियों का फैलना, मांस पेशियों में असंतुलन, एंटेक्जिया, लड़खड़ाना और मांस पेशियों में ऐठन हो सकते हैं।

Please read enclosed leaflet carefully before use.
Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.
सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रमुख ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।
ಗಮನವಾಗಿ ಓದಿ ಮುನ್ನ ಕರಕುಶಲವಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ.

CIR-184279/2021-Emamectin Benzoate (EC) (428)-2153 Emamectin Benzoate 1.9% E.C. Insecticide

ईमामेक्टिन बेन्जोएट १.९% ई.सी.

कीटनाशक

EXTOL
E.C.
एक्सटोल ई.सी.
ಎಕ್ಸ್ಟೋಲ್ ಇ.ಸಿ.

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

Keep out of
reach of
children

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें



An ISO 9001:2015
certified company



Chemical composition :	
Emamectin Benzoate Tech (Based on 95% W/W purity of a.i.)	2.00 % W/W
n-hexanol (Solvent)	33.00 % W/W
N-Methyl pyrrolidone (Co solvent)	28.70 % W/W
Blend of Anionic Ethoxylated Fatty Glycerides and Non ionic-Ethoxylated Sorbitan Esters	35.00 % W/W
Surfactants (Emulsifier)	
BHT (Antioxidant)	1.00 % W/W
Fumaric acid (Acidifier)	0.30 % W/W
Total : 100.00% W/W	

रासायनिक संरचना :	
ईमामेक्टिन बेन्जोएट टैक्निकल (९५% भार/भार स.त. पर आधारित)	२.०० % भार/ भार
एन हेक्सेनॉल (विलायक)	३३.०० % भार/ भार
एन मिथाइल पाइरोलीडोन (सह विलायक)	२८.७० % भार/ भार
अनायनिक- ईथॉक्सीलेटेड फैटी ग्लाइसराइड एवं नॉन आयनिक- ईथॉक्सीलेटेड सॉर्बिटन एस्टरस	३५.०० % भार/ भार
सर्फेक्टेंट्स का मिश्रण (इमल्सीफायर)	
बी एच टी (एंटीऑक्सिडेंट)	१.०० % भार/ भार
फूमरिक आम्ल (एसिडिफायर)	०.३० % भार/ भार
योग : १००.०० % भार/ भार	

Regn. No. / रजि.नं.	: CIR-184279/2021-Emamectin Benzoate (EC) (428)-2153
Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं.	: LCIM0320220025
Batch No. / बैच नं.	:
Mfg. Date / मैन्यु. तारीख	:
Exp. Date / खत्म होने की तारीख	:
Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन	:
Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मुल्य ₹:	:
(Incl. of all taxes) (समी करें सहित)	:

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.,

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
e-mail : elantaagrosangli@gmail.com Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436. Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





EXTOL E.C.


Emamectin Benzoate 1.9% E.C.
(Insecticide)

एक्सटोल ई.सी.

ईमामेक्टिन बेन्जोएट १.९% ई.सी.
(कीटनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-184279/2021-Emamectin Benzoate (EC) (428)-2153
EXTOL E.C.
Emamectin Benzoate 1.9% E.C.
(Insecticide)
Emamectin benzoate 1.9% E.C. is a water soluble liquid formulation containing 1.9% active ingredient and is recommended for the control of bollworms in Cotton : Leaf folder & hispa on Paddy; Green semilooper, Pod borer, Girdle beetle and Tobacco caterpillar on Soybean; pod borer on Checkpea; fruit borer & thrips on Chilli; Fruit borer (Helicoverpa armigera) on Tomato. It is an insecticide with stomach action and should be ingested by the larvae to be most effective. Affected larvae become paralyzed and stop feeding shortly after exposure to Emamectin Benzoate 1.9% E.C. and subsequently die after 2-4 days.
Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (g)	Formulation (ml)			
Cotton	Bollworms	11.0	580	500	15	-
Chickpea	Pod borer	7.13	375	500	14	-
Tomato	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	7.13	375	500	3	-
Paddy	Leaf folder & hispa	8.08	425	500	48	-
Chilli	Fruit borer & Thrips	7.13	375	500	14	-
Soybean	Green semilooper, Pod borer, Girdle beetle and Tobacco caterpillar	8.08	425	500	20	-

Direction of use : Apply the insecticide when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary. Apply the insecticide in sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the foliage.
Plant protection equipment : Knapsack sprayer, compression knapsack sprayer, battery operated power sprayer.
Time of application : Emamectin benzoate is recommended for the control of following pests in Cotton, when applied as foliar spray.
Precaution : 1) Avoid inhalation, skin or oral contact with pesticide. 2) Do not chew tobacco, eat food or smoke during spraying. 3) While spraying use protective clothing, rubber gloves, boots, face shield or dust mask, overall, rubber apron, hood or hat. 4) Spray only in the direction of wind currents and not against so as to avoid spray drifts setting on body. 5) Wash hands and contaminated parts of body well with soap and water after spraying. 6) Clean sprayer thoroughly with water after completion of work. **Symptoms of poisoning :** Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular in-coordination, ataxia and muscle tremors.
First aid : Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from under cooling. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. In case of ingestion: Give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately.
NOTE: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.
Phytotoxicity : Non phytotoxic when used as per recommendation.
Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.
Disposal of used container : 1) Dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) The packages shall be broken and buried away from habitation.
Storage conditions :
1) The packages containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2) The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical composition :	
Emamectin Benzoate Tech	(Based on 95% W/W purity of a.i.)
n-hexanol	2.00 % W/W
(N-Methyl pyrrolidone)	33.00 % W/W
Blend of Anionic Ethoxylated Fatty	Co solvent
Glycerides and Non ionic- Ethoxylated	Emulsifier
Sorbitan Esters Surfactants	28.70 % W/W
BHT	35.00 % W/W
Fumaric acid	Antioxidant
	Acidifier
	1.00 % W/W
	0.30 % W/W
Total : 100.00% W/W	

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.
Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-184279/2021-Emamectin Benzoate (EC) (428)-2153
एक्सटोल ई.सी.
ईमामेक्टिन बेन्जोएट १.९% ई.सी.
(कीटनाशक)
ईमामेक्टिन बेन्जोएट १.९% ई.सी. पानी में घुलने वाला तरल है, जिसमें १.९% सक्रिय तत्व है। यह कपास की डोडे की सुंडियाँ, धान में पत्ता लपेटक और हिस्पा; सोयाबीन में हरा अर्धकुंडलक, फल छेदक, गर्डल बीटल और तम्बाकू की सुंडी; काबुली चना में फली छेदक; मिर्च में फल छेदक और थ्रिप्स; टमाटर में फल छेदक (हेलिकोवर्पा आर्मजीरा) की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। यह कीटनाशक पेट में जाने पर असर दिखाता है और अच्छे नियंत्रण के लिए इसे इलियों के द्वारा खाना आवश्यक है। ईमामेक्टिन बेन्जोएट से संपर्क होने पर, इलियाँ लखवाग्रस्त हो जाती हैं और खाना बंद कर देती हैं तथा २-४ दिनों में मर जाती हैं।
उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अग्नि छिड़काव या कलम काटने के बाद छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)		
कपास	डोडे की सुंडिया	११.०	५८०	५००	१५
काबुली चना	फल छेदक	७.१३	३७५	५००	१४
टमाटर	फल छेदक (हेलिकोवर्पा आर्मजीरा)	७.१३	३७५	५००	३
धान	पत्ता लपेटक और हिस्पा	८.०८	४२५	५००	४८
मिर्च	फल छेदक और थ्रिप्स	७.१३	३७५	५००	१४
सोयाबीन	हरा अर्धकुंडलक, फल छेदक, गर्डल बीटल और तम्बाकू की सुंडी	८.०८	४२५	५००	२०

उपयोग के लिए निर्देश : जब इलियाँ पहली बार दिखाई देती हैं, तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का छिड़काव करें। जरूरत लगे तो, पुनः छिड़काव करें। कीटनाशक को निर्दिष्ट मात्रा के पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए। कृषी सुखा यंत्र : नैपसेक स्प्रेयर, कम्पेशन नैपसेक स्प्रेयर, बैटरी चालित पावर स्प्रेयर। प्रयोग का समय ईमामेक्टिन बेन्जोएट कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले निम्नलिखित कीटों के नियंत्रण के लिए अनुमोदित है। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ :** १) कीटनाशक को सांस द्वारा अंदर न लीजिए तथा मुंह या चमड़ी. का स्पर्श न होने दें। २) छिड़काव करते समय तम्बाकू न चबायें तथा खाना, पीना या धूमपान न करें। ३) छिड़काव करते समय बचाव की पूरी सुरक्षा, रबर के दस्ताने, बूट, चूल्हे का आवरण कणों से बचाव का मुखौटा, पूरे शरीर का आवरण, रबर एप्रन हुड या हैट पहनिये। ४) हमेशा हवा की दिशा में छिड़काव कीजिए। उसके विपरीत नही ताकि छिड़काव के कण शरीर पर न गिरे। ५) छिड़काव के बाद हाथ और त्वचा के उन हिस्सों को जहां कीटनाशक लगा हो अच्छी तरह साबुन और पानी से धोइए। ६) काम खत्म करने के बाद स्प्रेयर को अच्छी और पूरी तरह पानी से साफ कीजिए। **विष के लक्षण :** इस कीटनाशक से सम्पर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण, पुतलियों का फैलना, मांस पेशियों में असंतुलन, एटैजिया, लड़खड़ाना और मांस पेशियों में ऐंठन हो सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** रोगी को ताजी हवा में ले आये तथा उड़ा पड़ने से बचाए। त्वचा में लगने पर दूधित कपड़ों को उतार दें तथा कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। आंखों में चले जाने पर आंखों को स्वच्छ पानी से कई मिनटों तक छछपराएँ। पेट में चले जाने पर यदि रोगी पानी पी सकता है तो, एक या दो गिलास पानी दें। उल्टी न करायें और तुरंत डॉक्टर को बुलायें। सूचना : यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। **पौधविक्षाता :** सुझाव के अनुसार इस्तेमाल करने पर पौध विनाश नहीं है। **विष नाशक :** कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १) खाली डिब्बों व बचे हुए कीटनाशक का निपटारा सुरक्षित तरह से करें ताकि आसपास का वातावरण या पानी दूषित न हो। २) खाली डिब्बों को दुबारा प्रयोग से बचाने के लिए उन्हें बाहर न छोड़ें। ३) उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट कीजिये और जमीन में गाढ़ दीजिये। **संग्रहण की शर्तें :** १) कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए अथवा अलग अलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखें। २) कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत, सूखा, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहिए, जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना :	
ईमामेक्टिन बेन्जोएट टैक्निकल	(९५% भार/भार स.त. पर आधारित)
(एन हेक्सानोल)	२.०० % भार/भार
(एन मिथाइल पाइरोलीडोन)	३३.०० % भार/भार
अनायनिक-ईथाक्सीलेटेड फैटी	सह विलायक
ग्लाइसेराईड एवं अनायनिक-ईथाक्सीलेटेड	२८.७० % भार/भार
सॉर्बिटन एस्टर्स सरफैक्टैंट्स का मिश्रण	इमल्सीफायर
बी एच टी	३५.०० % भार/भार
फूमारिक अम्ल	एंटीऑक्सिडेंट
	एसीडिफायर
	१.०० % भार/भार
	०.३० % भार/भार
योग : १००.०० % भार/भार	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।

